

本署檔號 Our Ref.: (5) in DH SEB CD/8/50/1

各位校長/ 主任/ 老師:

預防猩紅熱

由二零一一年四月起，衛生防護中心接獲猩紅熱個案報告有所上升。在二零一一年內（截至六月八日），共錄得337宗，至今個案已超越過去十年每年總數。個案年齡由一個月至31歲（中位數: 6歲）。在二零一一年內（截至六月八日）共錄得四宗院舍爆發，當中包括兩宗在幼稚園 / 幼兒中心發生，一宗小學及另一宗在特殊幼兒中心，共影響16人。本署特函通知閣下提高警覺預防猩紅熱在貴校內傳播。

猩紅熱是一種傳染性高的疾病，主要由細菌引致。患者通常透過呼吸或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播。2至8歲的兒童通常最易受感染。猩紅熱的症狀為發燒、咽喉痛及出疹。皮疹會在發病首天或翌日在軀幹或頸部出現，接着蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部及腹股溝。典型的猩紅熱疹並不包括面部。該種皮疹的特點是患處皮膚粗糙。皮疹會在1星期後消退，手掌和腳底繼而會脫皮。隨猩紅熱併發的病症，有時還包括中耳感染和腎病。服用合適的抗生素可有效治療猩紅熱。如懷疑患上猩紅熱，應立即向醫生求診。

要預防猩紅熱，請注意以下措施：

- 維持良好的個人及環境衛生。
- 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。
- 雙手被呼吸系統分泌物弄污後(如打噴嚏後)應立即洗手。
- 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。
- 保持空氣流通。
- 患上猩紅熱的病人，不應上學或返回學校/幼兒中心，直至完全康復為止。



如察覺學生及職員出現猩紅熱增加，請盡早通知衛生防護中心(傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772)。我們會就如何處理這些個案提供指引，並採取適當控制措施。如欲取得更多資料，可瀏覽衛生防護中心網站(網址為<http://www.chp.gov.hk>)。

衛生署衛生防護中心總監

(張竹君



醫生代行)

二零一一年六月九日



衛生防護中心乃衛生署
轄下執行疾病預防
及控制的專業架構
*The Centre for Health
Protection is a
professional arm of the
Department of Health for
disease prevention and
control*

香港九龍亞皆老街 147C 號 3 樓
3/F, 147C Argyle Street, Kowloon, Hong Kong