

HARiS -2015年愛滋病預防項目指標調查-男跨女跨性別人士

背景

男跨女跨性別人士一向是容易被忽略及難以接觸的社群。然而，不同研究顯示，此社群的愛滋病病毒感染率可以相當高。為進一步了解本港情況，我們於 2014 年的「愛滋病預防項目指標調查」(HARiS) 中首次將男跨女跨性別人士納入為高危社群之一。

本調查目的是要建立一個以社區為基礎的行為調查，以收集高危社群的愛滋病相關風險行為和測試行為的統一指標數據，隨時間追蹤及評估本港愛滋病健康推廣和監測計劃的覆蓋率和成效。

第三次的HARiS（2015）再次委託香港中文大學何鴻燊防治傳染病研究中心進行。

方法

此次調查一共有三間非政府機構參與。受訪者分別通過自願愛滋病病毒測試服務(兩間)、外展及網上活動(各一間)在2015年4月至6月期間招募。任何曾經和另一名男性進行過口交或肛交，而又界定自己為女性的男性都符合參加資格。受訪者會被邀請填寫一份問卷。

結果

1. 受訪者基本人口統計資料

三間非政府機構一共訪問了66名男跨女跨性別人士（非政府機構中心: 13名；外展: 39名；網上: 14名）。受訪者當中53.0%為華人、37.9%為菲律賓人、4.5%為泰國人。少於一半(42.4%)在調查期之前的六個月內在港居住超過三個月。

2. 性行為及安全套的使用

在調查期之前的六個月內，分別有59.1%、53.0%及56.1%的受訪者表示曾經和有感情關係的伴侶、固定性伴侶及非固定性伴侶進行性交，而最近一次性交的安全套使用率分別為82.1%、85.7%及91.9%。大約三分二的受訪者(48.5%)在過去六個月內曾經和商業性伴侶性交，而最近一次性交的安全套使用率為93.8%。

3. 愛滋病病毒測試

66名受訪者當中，有52人(78.8%)曾接受愛滋病病毒測試及有48人(72.7%)知道他們的測試結果。當中有40人(60.6%)的測試是在調查期之前的一年內進行，當中36人(54.5%)知道自己最近的測試結果。

非政府機構及私營醫療服務是最多受訪者接受測試的地方，各佔曾經測試者的38.5%，其次是公營醫療服務(19.2%)。

4. 藥物及酒精使用

受訪者當中，有43.9% 和12.1% 曾在過去六個月內在性行為以前或進行期間使用酒精和藥物。當中芳香劑(Poppers) (62.5%)及冰(37.5%)為最常見。

分析

1. 雖然本調查結果顯示，男跨女跨性別人士與各類性伴侶進行性行為時的安全套使用率均高於 82%，但仍需繼續向他們提倡與所有類型性伴侶進行性行為時都要持續使用安全套。
2. 曾接受愛滋病病毒測試(78.8%)和一年內曾接受測試(60.6%)的比率，比 2014 年(分別為 72.9%及 50.8%)有所增加，但仍未如理想。因此需要在社群中進一步推廣定期測試。
3. 是次調查發現相當比例的跨性別人士(58%)為流動人口，非華裔(58%)及涉及性工作(48.5%)。相比其他高危社群，他們會較少到愛滋病服務中心接受服務。因此在這社群中推廣預防愛滋病及測試服務時，應以外展服務(儘可能以朋輩參與模式)為主。

HARiS -愛滋病預防項目指標調查2015-男跨女跨性別人士資料頁

由衛生署衛生防護中心

特別預防計劃出版

電話：3143 7225 傳真：2780 9580

網址：<http://www.aids.gov.hk> 電郵：aids@dh.gov.hk

二零一六年四月