
豬鏈球菌 感染







●● 病原體

豬鏈球菌感染是由豬鏈球菌引起的動物傳染病,屬於香港法定須呈報的傳染病。

○ 病徵

此病最常引致腦膜炎,病徵包括發燒、頭痛和嘔吐,亦可引致皮下出血。少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。常見的併發症是失聰,而且大多是永久性的。

傳播途徑

豬鏈球菌感染是豬隻的常見傳染病。這種細菌可存在於豬隻的上呼吸道,並透過豬隻間鼻子與鼻子的接觸或近距離的噴沫傳播。



人類感染豬鏈球菌個案主要發生於成年人。 它是通過直接接觸而傳播。細菌通常是當處 理受感染豬隻或其他動物、生的豬肉或其他 豬產品時,經破損的皮膚傷口進入人體。但 亦有可能經進食或通過黏膜而傳播的。

高危人士

高危人士包括飼養豬隻人 士、於屠房工作人員、 責處理和運送肉類的師 、售賣鮮肉人士和廚人士 另外,免疫力較弱的人士 包括已切除脾臟者、、酗酒 者等都會有較大機會受到 感染。





20 港

潛伏期

由數小時至兩星期

•

治理方法

抗生素可治療豬鏈球菌感染。

預防方法

現時並沒有預防豬鏈球菌感染的疫苗。市民 應採取下列措施以減低感染風險:

保持良好的個人衞生

- 經常保持雙手清潔
- 避免接觸豬隻(包括野豬)和其他動物;否則 在接觸後·應儘快以梘 液和清水清潔雙手



- 處理豬隻或生豬肉時, 應佩戴手套和慎防損傷
- 處理生豬肉前,應先用 防水敷料妥善覆蓋傷口



保持良好的食物衞生

• 從衞生及可靠的地方購 買食物,不要光顧無牌 小販



- 生的豬肉須存放在蓋好的容器內,並貯存 於攝氏 4 度或以下的雪櫃
- 分開處理和擺放生豬肉和熟食
- 徹底清潔曾與生豬肉接觸過的工作枱面、 器皿及設備
- 豬肉要徹底煮熟方可進食

市民如懷疑感染豬鏈球菌,應立刻求診, 並告知醫生相關接觸史。



衞生防護中心網站

www.chp.gov.hk

衞生署健康教育專線

2833 0111

二零一九年十一月修訂