

## 「疫苗資助計劃 2017/18」 接種季節性流感疫苗和肺炎球菌疫苗的資料

### (I) 「疫苗資助計劃」

為鼓勵季節性流感疫苗(流感疫苗)接種以預防流感及其併發症，政府會繼續推行「疫苗資助計劃」。由2017年10月/11月起(請留意政府的公布)，合資格人士到已登記參與計劃的私家醫生診所接種流感疫苗，可獲每劑疫苗港幣190元的資助。九歲以下從未接種過流感疫苗的合資格兒童，可獲資助接種兩劑。



65 歲或以上合資格長者亦可獲資助到已登記參與計劃的私家醫生診所接種肺炎球菌疫苗(全年適用)。每劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗(二十三價疫苗)資助額港幣 190 元。每劑十三價肺炎球菌結合疫苗(十三價疫苗)資助額港幣 730 元。(請參考第(III)部分)

#### 1. 誰符合資格參加「疫苗資助計劃」？

以下香港居民，均符合資格參加「疫苗資助計劃」：

- 孕婦；
- 65 歲或以上長者；
- 年齡介乎 6 個月至未滿 12 歲，或 12 歲或以上但仍就讀於香港小學的兒童；
- 合資格的智障人士：持有勞工及福利局(康復服務中央檔案室)簽發的殘疾人士登記證(註明智障)、或註冊醫生/指定服務智障人士機構負責人簽發的證明書(證明該人士為智障人士或符合「2017/18 疫苗資助計劃」的資助資格)；
- 領取傷殘津貼的人士

(部分符合資格人士亦可選擇到「政府防疫注射計劃」的公營診所免費接種疫苗。詳情請瀏覽衛生防護中心網站 [www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk)。)

#### 2. 合資格人士可到哪些醫生診所接種獲資助的疫苗？

合資格人士到已登記參與計劃的私家醫生診所接種疫苗，便可獲得資助。已登記參與計劃的私家醫生，會在其診所張貼計劃標記。此外，衛生防護中心網站 [www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk) 亦會上載已登記參與計劃的醫生資料和他們的收費。

#### 3. 誰人可簽署「使用疫苗資助同意書」？

18 歲以下人士 / 精神上無認知能力的人士，應由父母或監護人簽署「使用疫苗資助同意書」。其他接受疫苗接種人士可自行簽署「使用疫苗資助同意書」。

#### 4. 若家長 / 監護人未能親身陪同合資格兒童 / 受監護人前往診所接種疫苗，他 / 她可否委託他人(例如：親友 / 家庭傭工)攜同合資格人士前往診所？

可以，但家長 / 監護人須預先填妥並簽署「使用疫苗資助同意書」才可獲得資助。家長 / 監護人可向參與計劃的私家醫生診所索取，或在衛生防護中心網站下載該同意書。

### (II) 接種季節性流感疫苗(流感疫苗)的資料

三價和四價滅活流感疫苗均獲衛生防護中心「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在本港使用。三價疫苗預期可以預防大多數的流感個案，而四價疫苗則可能提供對抗乙型流感的額外保護。詳情請向你的家庭醫生查詢。在接種疫苗後，由於身體須約兩星期才能產生抗體預防流感病毒，因此應盡早接種疫苗。

#### 1. 為什麼要接種流感疫苗？誰該接種疫苗？

接種流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。基於流感疫苗是安全和有效的，而健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士都適宜接種流感疫苗，以保障個人健康。

#### 2. 建議接種的 2017/18 年度流感疫苗的組合有甚麼成分？

「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在 2017/18 年度使用的疫苗包括以下成分：

- 類甲型/密歇根/45/2015 (H1N1)pdm-09 病毒
- 類甲型/香港/4801/2014 (H3N2) 病毒
- 類乙型/布利斯本/60/2008 病毒

如果四價流感疫苗被採用，它應包括以上三種病毒及類乙型/布吉/3073/2013 病毒。

### 3. 減活流感疫苗是否安全?可能有甚麼副作用?

減活流感疫苗十分安全，除了可能在注射部位出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後6至12小時內可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，但這些症狀通常會在兩天內減退。若持續發燒或不適，請諮詢醫生。如出現風疹塊、口舌腫脹或呼吸困難等較為罕見的嚴重過敏反應，患者必須立即求醫。

一些罕見但嚴重的不良情況也可能在接種流感疫苗後出現，如吉-巴氏綜合症(每100萬個接種疫苗的人士中約有一至兩宗個案)，以及嚴重過敏反應(每分發1000萬劑疫苗中有9宗個案)。不過，接種流感疫苗與這些不良情況未必一定有因果關係。有研究顯示在感染流感後出現吉-巴氏綜合症的風險(每100萬個感染者有17.20宗個案)遠比接種流感疫苗後(每100萬個接種疫苗的人士中有1.03宗個案)為高。

### 4. 誰不宜接種減活流感疫苗?

對曾接種的減活流感疫苗或其他疫苗成分有過敏反應的人士，都不宜接種減活流感疫苗。對雞蛋有輕度過敏的人士如欲接種流感疫苗，可於基層醫療接種減活流感疫苗。而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應先由過敏學或免疫學專科醫生進行評估，並因應臨牀需要，由這些專家接種減活流感疫苗。至於出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生。如接種當日因病發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。

### 5. 每年須要接種多少劑流感疫苗?

9歲或以上人士只須接種一劑2017/18年度流感疫苗。

為確保對流感產生足夠的免疫力，凡9歲以下從未接種過流感疫苗的兒童均須於2017/18年度接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗接種時間須相隔至少四星期。在2016/17年度或以前接種過流感疫苗的兒童，在2017/18年度只須接種一劑疫苗。

### 6. 如首次接種流感疫苗的9歲以下兒童需要接種兩劑疫苗，這兩劑疫苗是否需要屬同一種類?

第一和第二劑疫苗並不需要相同。第一或第二劑疫苗都可以選擇三價或四價減活流感疫苗。兩劑疫苗的接種時間需要相隔至少4個星期。

## (III) 長者接種肺炎球菌疫苗的資料

長者有較高機會出現嚴重侵入性肺炎球菌感染，例如敗血病、肺炎和腦膜炎等。接種疫苗能有效預防這些感染和其併發症。

為加強預防肺炎球菌感染，政府會為65歲或以上的香港居民提供以下的肺炎球菌疫苗接種資助：

65歲或以上長者	未曾接種過肺炎球菌疫苗	已經接種二十三價疫苗
沒有高風險情況	資助接種一劑二十三價疫苗	不用再接種
有高風險情況	資助接種一劑十三價疫苗，接着一年後接種一劑二十三價疫苗	在上一次二十三價疫苗接種一年後，資助補種一劑十三價疫苗

高風險情況包括曾患侵入性肺炎球菌病、腦脊液滲漏或裝有人工耳蝸；長期心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病；新陳代謝疾病包括糖尿病或肥胖（體重指數30或以上）；免疫力弱（因情況如無脾、人類免疫力缺乏病毒感染/愛滋病或癌症/類固醇治療引致）；及長期神經系統疾病致危及呼吸功能、難於處理呼吸道分泌物、增加異物入肺風險或欠缺自我照顧能力。

### 1. 肺炎球菌疫苗是否安全?可能有甚麼副作用?

肺炎球菌疫苗已獲證實安全。常見不良反應包括接種疫苗部位可能在接種後短時間內出現輕微腫脹及疼痛，但大部分反應在兩天內會自然消退。有些人可能會出現輕微發熱、疲勞、頭痛、發冷或肌肉疼痛。

### 2. 誰不宜接種肺炎球菌疫苗?

如曾在接種肺炎球菌疫苗後或對該疫苗的成分或含有白喉類毒素的疫苗出現嚴重過敏反應，或正接受癌症治療或電療，則不應接種。

如欲獲取更多有關「疫苗資助計劃」資訊，請瀏覽衛生防護中心網站 [www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk) 或致電2125 2125查詢。