

กลุ่มอาการออทิซึม


(Thai Version)

กลุ่มอาการออทิซึม (ASD) เป็นความผิดปกติของการพัฒนาการทางระบบประสาท โดยมีหลายระดับของความบกพร่องและการพัฒนาการล่าช้าในการปฏิสัมพันธ์กับสังคม การทำงานและพฤติกรรมทางอารมณ์และทางความคิด ลักษณะอาการที่ชัดเจนคือมักมีความลำบากในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ซ้ำ ๆ หรือที่จำกัด

ลักษณะอาการทั่วไป ประกอบด้วย

ความลำบากในการปฏิสัมพันธ์กับสังคม

ความยากลำบากในการสื่อสารกับผู้อื่นและทางอารมณ์




ความยากลำบากในการสนทนาโต้ตอบอย่างปกติ เช่น พูดออกนอกเรื่อง

ความยากลำบากในการแสดงอารมณ์หรือการตอบสนอง เช่น ไม่ยิ้มตอบ

ขาดความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นได้ยาก

ความยากลำบากในการสื่อสารด้วยภาษากาย




ลดการสบตาซึ่งอาจดูไม่มีมารยาทหรือไม่จดจ่อ

แปลงเสียงแปลก ๆ เช่น เสียงต่ำเหมือนเสียงเครื่องยนต์

บกพร่องในการใช้ท่าทางและการแสดงสีหน้าในการสื่อสาร

ความยากลำบากในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์




ความยากลำบากในการสร้างและรักษาเพื่อน

ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับบริบททางสังคมต่างๆ ยาก เช่น ยกหรือตั้งคำถามหรือข้อความที่ไม่ตรงกับบริบททางสังคม

ขาดความสนใจในตัวเพื่อน ชอบเล่นคนเดียว

รูปแบบพฤติกรรมที่ซ้ำ ๆ หรือที่จำกัด

กิริยาหรือคำพูดที่ซ้ำ ๆ หรือแบบแผน




การเคลื่อนไหวร่างกายแบบแผน เช่น สะบัดมือ

พฤติกรรมที่จำกัดและเป็นพิธีกรรม เช่น เรียงของเล่น

พูดเรียงประโยคไม่ถูก เช่น พูดเลียนแบบคำ ๆ นั้นโดยไม่เข้าใจ


หมกมุ่นกับสิ่งเดิม ๆ



การปฏิบัติตามกฎบางอย่างอย่างเคร่งครัด

จะทุกข์ใจอย่างมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย


ความสนใจเฉพาะ



สนใจเรื่องบางอย่างอย่างแบบหมกมุ่น

ชอบจ้องมอง วัตถุบางอย่างเช่น ดูพัดลมหมุน

ปัญหาทางประสาทสัมผัสที่ผิดปกติ



ภาวะไวต่อต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส เช่น การตอบสนองต่อเสียงที่เฉพาะเจาะจง

ความสนใจทางประสาทสัมผัสที่ผิดปกติเช่น ดมกลิ่นหรือจับเล่นวัตถุบางอย่างมากเกินไป

การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มอาการ ASD



การประเมินและการวินิจฉัย



การอบรมด้านพฤติกรรมและด้านการศึกษา



กลุ่มอาการออทิซึม

