

ตัวเรือด

ตัวเรือดคืออะไร?

ตัวเรือดเป็นแมลงปรสิตขนาดเล็กที่กินเลือดของสัตว์เลือดอุ่นเพียงอย่างเดียว มีสองสายพันธุ์ของโรคจิตเตี้ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญให้กับมนุษย์คือข้อผิดพลาดเตี้ยทั่วไป, *ซีเม็กซ์โลกทูลาริอัส*, และข้อผิดพลาดเตี้ยเขตร้อน, แทรกแท็ก *เฮมิปเทร็กซ์ซีเม็กซ์* อดีตได้รับการกระจายไปทั่วโลกในขณะที่ส่วนใหญ่พบหลังในภูมิภาคเขตร้อน ทั้งสองสายพันธุ์พบได้ในช่องกม แม้ว่า การปรากฏตัวของโรคจิตเตี้ยได้รับการมองว่าเป็นปัญหาในประเทศกำลังพัฒนาแต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในส่วน of สหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรส่วนอื่นๆของยุโรปและเกาหลี

วงจรชีวิตของตัวเรือดคืออะไร?

โรคจิตเตี้ยไปผ่านไข่, ฝีและขั้นตอนผู้ใหญ่ ไข่จะฟักออกมาในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ อุณหภูมิ 18 ถึง 25°C; ขั้นตอน ในฟรอล ใช้เวลา 14 ถึง 30 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ อายุการใช้งานของตัวเรือดสำหรับผู้ใหญ่อาจถึง 9-18 เดือนและหกกิ่งเจ็ดรุ่นสามารถผลิตได้ภายใต้เงื่อนไขที่ติดต่อกัน ข้อบกพร่องของเตี้ยมักจะถูกขนส่งจากสถานที่ไปยังสถานที่ผ่านรายการเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์

แมลงบนเตียงแพร่กระจายโรคอะไร?

ขณะนี้ตัวเรือดยังไม่สามารถแพร่กระจายโรคได้

สัญญาณของการระบาดของแมลงในเตียงคืออะไร ?

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกกัดเตี้ยเมื่อไปที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเตี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงของผู้เข้าพัก (เช่นห้องพักรอพักและโรงแรม) มักพบรอยกัดบนส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่ได้ถูกปกคลุมขณะนอนหลับ (เช่นใบหน้าคอแขนและมือ) รอยกัดเหล่านี้อาจใช้เวลาจนถึง 14 วันในการพัฒนาในบางคน การตอบสนองต่อการกัดของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่มีผลกระทบที่มองเห็นได้ไปจนถึงจุดสีแดงเล็ก ๆ ไปจนถึงอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้น อาการแพ้อาจรวมถึงรอยกัดขนาดใหญ่และอาการบวมที่เจ็บปวดที่บริเวณที่กัด การกัดอาจทำให้เกิดอาการคันซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนมากเกินไปซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อที่ผิวหนังซ้ำ นที่สอง ข้อบกพร่องของเตี้ยอาจพบได้ในที่นอนและผ้าปูที่นอน นอกจากนี้ อาจพบโครงกระดูกภายนอกของตัวเรือดหรือจุดสีสนิม (สิ่งขับถ่ายของตัวเรือด) บนที่นอนหรือเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียง

วิธีการจัดการข้อผิดพลาดเตี้ยกัด ?

ข้อผิดพลาดของเตี้ยมักจะแก้ไขได้ในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ บุคคลควรหลีกเลี่ยงการเกาและรักษาความสะอาดของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สามารถให้การรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบาย

ขอคำแนะนำทางการแพทย์หากอาการยังคงอยู่หรือแย่ลง

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรงต่อการกัดอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการจัดการที่สนับสนุน

จะอย่างไรถ้าพบสัญญาณของข้อผิดพลาดเตียง ?

- ซักผ้าห่มและผ้าปูเตียงที่มีเชื้อราในน้ำร้อน (60°C) แล้วตากแดดให้แห้งหรือเตารีด
- ปิดผนึกสิ่งของที่ไม่สามารถอบซुบด้วยความร้อนในถุงพลาสติกและวางไว้ในช่องแช่แข็ง (-18 °C) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ใช้ลมร้อนหรือไอน้ำโดยตรงกับรอยแตกและรอยแยกที่พบข้อบกพร่องของเตียง
- ใช้ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างเพื่อรักษาเฟอร์นิเจอร์รอยแตกและรอยแยกในพื้นที่และผนังที่พบข้อบกพร่องของเตียง
- พิจารณาแต่งตั้งบริษัทควบคุมสัตว์รบกวนเพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพในการควบคุมและป้องกันแมลงบนเตียง

มีคำแนะนำพิเศษสำหรับผู้เดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดเตียงหรือไม่ ?

ก่อนการเดินทาง

- ใช้กระเป๋าเดินทางที่มีฝาหุ้มแข็งแรงๆ ถ้าเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลี่ยนน้ำเต้าปูนที่จะติดตัวไปกับกระเป๋าเดินทาง
- เก็บเสื้อผ้าของคุณไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกใหม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงติดเข้ากับเตียง

ระหว่างการเดินทาง

- ตรวจสอบเตียงหมอนที่นอนและเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะสำหรับโรคจิตเตียงและเปลี่ยนห้องหากมีสัญญาณของโรคจิตเตียง
- หลีกเลี่ยงวางกระเป๋าเดินทางบนพรม วางไว้บนตู้หรือชั้นวางของ
- เก็บเสื้อผ้าในกระเป๋าเดินทางและปิดกระเป๋าเมื่อไม่ได้ใช้

หลังการเดินทาง

- ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางและเสื้อผ้าอย่างระมัดระวังสำหรับตัวเรือด
- หากมีข้อสงสัยให้จัดการเสื้อผ้าและสิ่งของด้วยน้ำร้อนและไอน้ำตามที่แนะนำข้างต้น

[แนวทางป้องกันและควบคุมตัวเรือดในสถานที่ภายในประเทศ \(โดย อาหาร และแผนกสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม\)](https://www.fehd.gov.hk/english/pestcontrol/library/pdf_pest_control/bedbugs.pdf)

https://www.fehd.gov.hk/english/pestcontrol/library/pdf_pest_control/bedbugs.pdf

13 พฤศจิกายน 2023 (13 November 2023)