

Panduan Singkat
Apakah saya bisa menerima Vaksinasi COVID-19?

7 Mei 2021

3 Pertimbangan Penting

- Sebagian besar kita cocok menerima vaksinasi COVID-19.
- Dapatkan vaksinasi COVID-19, lindungi diri Anda sendiri dan orang lain, dan kurangi peluang mutasi virus.
- Orang-orang yang berusia lanjut atau yang mengidap penyakit kronis **rentan** terhadap infeksi COVID-19 dengan **tingkat kematian yang meningkat**.
- Oleh karena itu, kecuali disertai kontraindikasi, mereka didorong untuk **menerima vaksinasi COVID-19** untuk perlindungan.
- Secara umum, 3 pertimbangan penting apakah akan menerima vaksinasi:

Kondisi medis	Waktu terbaik untuk vaksinasi	Riwayat Alergi
Jika stabil, lanjutkan	Jika pulih, dalam masa penyembuhan, atau penyakit sudah dalam kendali, lanjutkan	Berhati-hatilah dengan 3 kondisi di bawah ini <ul style="list-style-type: none"> • dugaan adanya reaksi alergi terhadap vaksinasi COVID-19 sebelumnya • riwayat anafilaksis • reaksi alergi parah dan cepat (dalam 1 jam) terhadap beberapa makanan atau lebih dari 1 kelas obat Harus berkonsultasi dengan dokter Anda

- Jika Anda mengidap penyakit kronis dalam **kendali stabil**, **Anda harus divaksinasi** untuk perlindungan karena **Anda berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19**.
- Jika Anda tidak yakin dengan kendali atau kondisi tersebut, Anda harus berdiskusi dengan dokter Anda terlebih dahulu dan putuskan **waktu terbaik** untuk memperoleh vaksinasi.
- Jangan divaksinasi jika Anda mengalami **kontraindikasi** berikut

Vaksin Comirnaty	<ul style="list-style-type: none"> • alergi terhadap dosis Comirnaty sebelumnya atau komponen vaksinnnya
Vaksin CoronaVac	<ul style="list-style-type: none"> • riwayat alergi terhadap CoronaVac atau vaksin tidak aktif lainnya • reaksi alergi parah terhadap vaksin • kondisi neurologis parah • setiap reaksi parah sistem saraf setelah vaksinasi CoronaVac • penyakit kronis parah yang tidak terkendali • wanita hamil dan menyusui

Contoh Penyakit Kronis

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hipertensi ➤ Diabetes ➤ Penyakit hati kronis ➤ Penyakit rematik autoimun 	<p>Jika stabil, Harus divaksinasi</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kanker 	<p>Mereka yang sedang dalam masa penyembuhan harus divaksinasi. Mereka yang dalam perawatan aktif harus berdiskusi dengan dokter mengenai pengaturan waktu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien dengan masalah imum (<i>Immunocompromised</i>) 	<p>Harus divaksinasi. Berdiskusi dengan dokter mengenai pengaturan waktu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerima transplantasi organ 	<p>Harus divaksinasi. Kecuali untuk mereka yang baru saja menerima transplantasi atau mengonsumsi imunosupresan dosis tinggi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengonsumsi antikoagulan oral 	<p>Dapat divaksinasi. Lakukan tekanan langsung dalam waktu lama setidaknya 5 menit di lokasi suntikan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infarksi miokardial akut atau stroke akut 	<p>Tunggu 3 hingga 6 bulan untuk vaksinasi. Setelah kondisi distabilkan.</p>

- Orang-orang yang menerima vaksinasi harus **melanjutkan pengobatan mereka.**

Untuk informasi terbaru tentang vaksin COVID-19, kunjungi: www.covidvaccine.gov.hk