

Mabilis na Patnubay

Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?

23 Hunyo 2021

3 Mahalagang Pagsasaalang-alang

- Ang karamihan sa atin ay angkop para sa pagbabakuna ng COVID-19.
- Kumuha ng bakuna sa COVID-19, protektahan ang iyong sarili at ang iba, at bawasan ang posibilidad ng pag-mutate ng virus.
- Ang mga indibidwal na may edad na o may malalang mga sakit ay **mahina** laban sa COVID-19 na impeksyon na may **mas mataas na dami ng namamatay**.
- Samakatuwid, maliban kung may mga kontraindikasyon, hinihimok silang **makatanggap ng bakuna sa COVID-19** para sa proteksyon.
- Sa pangkalahatan, 3 mahahalagang pagsasaalang-alang kung makakatanggap ng pagbabakuna:

Kondisyong medikal	Ang pinakamahusay na panahon para sa pagbabakuna	Kasaysayan ng allerdyi
Kung maayos ang pakiramdam, magpatuloy	Kung nakuhang muli, sa remission, o sakit ay kontrolado na, magpatuloy	Mag-ingat para sa 3 mga kondisyon sa ibaba <ul style="list-style-type: none"> • pinaghihinalaang reaksyon ng allerdyi sa naunang pagbabakuna ng COVID-19 • kasaysayan ng anaphylaxis • malubhang agarang (sa loob ng 1 oras) reaksyon ng allerdyi sa maraming pagkain o higit sa 1 klase ng mga gamot Dapat kumonsulta sa iyong doktor

- Kung mayroon kang (mga) malalang sakit na nasa ilalim ng **matatag na kontrol**, dapat kang **mabakunahan** para sa proteksyon dahil nasa **mas mataas na peligro para sa matinding karamdaman mula sa COVID-19**.
- Kung hindi ka sigurado tungkol sa kontrol o kundisyon, dapat mong talakayin muna sa iyong doktor at magpasya kung anong **pinakamahusay na oras** para sa pagbabakuna.
- Huwag magpabakuna kung mayroon kang mga sumusunod na (mga) **kontraindikasyon**

Comirnaty vaccine	<ul style="list-style-type: none"> • allerdyi sa nakaraang dosis ng Comirnaty o bahagi ng bakuna
CoronaVac vaccine	<ul style="list-style-type: none"> • kasaysayan ng allerdyi sa CoronaVac o iba pang mga bakunang hindi naaktibo • dating matinding reaksiyong allerdyi sa bakuna • malubhang kondisyon ng neurological • anumang masamang reaksyon ng sistema ng nerbiyos pagkatapos ng pagbabakuna ng CoronaVac • hindi nakontrol na matinding mga malalang sakit • mga babaeng buntis at nagpapasuso

Halimbawa ng Chronic Diseases

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hypertension ➤ Diabetes ➤ Chronic liver diseases ➤ Autoimmune rheumatic diseases 	Kung maayos ang pakiramdam, Magpabakuna
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mga kanser 	Ang mga nasa remission ay dapat mabakunahan. Ang mga nasa aktibong paggamot ay dapat talakayin sa doktor sa oras.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mga pasyenteng immunocompromised 	Dapat mabakunahan. Talakayin sa doktor para sa pinakamahusay na tiyempo.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organ transplant recipients 	Dapat mabakunahan. Maliban sa mga nakatanggap lamang ng paglipat o sa mataas na dosis na immunosuppression.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nasa oral anticoagulants 	Maaaring mabakunahan Mag-apply ng matagal na direktang presyon nang hindi bababa sa 5 minuto sa lugar ng pag-iniksyon.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acute myocardial infarction o acute stroke 	Maghintay ng 3 hanggang 6 na buwan para sa pagbabakuna. Matapos ang kondisyon ay nagpapatatag.

- Ang mga indibidwal na tumatanggap ng pagbabakuna ay **magpapatuloy sa kanilang gamot.**

Para sa mga nakatatanda

- Ang mga nakatatanda **ang grupong may pinakamataas na banta** ng komplikasyon at pagkamatay dahil sa sakit dala ng COVID-19. Dapat silang **mabakunahan agad** para sa sarili nilang proteksyon.
- Nirerekomenda ng mga eksperto na sinumang nakatatanda na nakatanggap na ng influenza vaccines noon ay maaaring ligtas na makatanggap ng COVID-19 vaccines.
- Para sa mahihinang nakatatanda, dapat tingnan nang maigi ang benepisyo kompara sa banta.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, bisitahin ang:

www.covidvaccine.gov.hk