ڈینگی بخار

(Urdu version)

یہ ڈینگی وائرس کے باعث لگتا ہے




انکیوبیشن مدت

اس کے پھیلاؤ کے 3-14 ایام، اور عام طور پر 4-7 ایام ہوتے ہیں

علامات

تیز بخار، شدید سر درد، آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد، اعضاء اور جوڑوں کا درد، متلی، قے، سوجے ہوئے لمفی غدود اور رگڑ



کسی سفری دورے کے بعد کوئی فرد خود کو بیمار محسوس کر رہا ہو تو اسے جس قدر جلد ممکن ہو طبی مشورہ طلب کرنا چاہیے اور اپنے سفری دورے کی تفصیلات معالجین کو فراہم کرنی چاہئیں۔





ڈینگی کے وائرس

- یہ چار مختلف سیروٹائپس پر محیط ہے
- پہلے انفیکشن کی علامات عموماً معتدل ہوتی ہیں، مگر اس کے بعد ہونے والے نفیکشنز جن میں دیگر سیروٹائپس ہوتے ہیں وہ شدید ڈینگی کا باعث بن سکتے ہیں (جس کو 'ڈینگلی ہیموریگک بخار' بھی کہتے ہیں)
- اگرچہ صحت یابی ہو جائے، اس کے باوجود عمر بھر شدید ڈینگی لاحق رہنے کا احتمال رہتا ہے
- شدید ڈینگی ڈینگی بخار کی ایک شدید اور ممکنہ طور پر مہلک پیچیدگی ہے۔



تحفظ

- کھڑے پانی کے گڑھوں کو ختم کریں
- مچھروں کے کاٹنے سے بچیں



衞生防護中心 Centre for Health Protection

衞生防護中心網站 Centre for Health Protection Website
www.chp.gov.hk

衞生防護中心 Facebook 專頁 Centre for Health Protection Facebook Fanpage
fb.com/CentreforHealthProtection

衞生署 Department of Health

Revised in July 2023
二零二三年七月修訂