

डेङ्गु ज्वरो

कारक तत्व

डेङ्गु ज्वरो डेङ्गु भाइरसको कारण हुने एक तीव्र लामखुट्टेले-सार्ने संक्रमण हो । यो संसारभरिका

उष्णकटिबंधीय र उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरूमा पाइन्छ । उदाहरणका लागि, डेङ्गु ज्वरो दक्षिण पूर्व एशियाका

धेरै देशहरूमा हुने एक स्थानीय रोग हो । डेङ्गु भाइरस चार फरक प्रकारका हुन्छन्, प्रत्येकले डेङ्गु ज्वरो

र गम्भीर डेङ्गु ('डेङ्गु रक्तश्रावी ज्वरो' पनि भनिन्छ) निम्त्याउन सक्छ ।

क्लिनिकल सुविधाहरू

डेङ्गु ज्वरोको चिकित्सकीय वर्गीकरण उच्च ज्वरो आउने, गम्भीर टाउको दुख्ने, आँखाको पछाडि दुख्ने, मांसपेशी

र जोर्नीको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, सुन्निएको ग्रन्थी, दाना र डाबर जस्ता लक्षणहरू द्वारा गरिन्छ

। केही संक्रमित व्यक्तिहरूमा स्पष्ट लक्षण विकसित नहुन सक्छ, र केहीलाई, जस्तै साना बच्चाहरूमा तातोपनका

साथै डाबरहरू जस्ता हलुका ज्वरोको लक्षणहरू देखाउन सक्छ ।

पहिलो संक्रमणका लक्षणहरू सामान्यतया हलुका हुन्छन् । एकपटक ठिक भइसकेपछि, एक प्रकारको डेङ्गु

भाइरस प्रति आजीवन प्रतिरक्षा विकास हुन्छ । तथापि, ठिक भइसकेपछि अन्य तीन प्रकारका भाइरस प्रति

आंशिक र अस्थायी प्रतिरक्षा मात्र हुन्छ । डेङ्गु भाइरसका अन्य प्रकारका पछिल्लो संक्रमणहरूले गम्भीर डेङ्गु निम्त्याउने बढी सम्भावना हुन्छ ।

गम्भीर डेङ्गु, डेङ्गु ज्वरोको एक गम्भीर र सम्भावित घातक जटिलता हो । शुरुमा 2 - 7 दिनसम्म 40

- 41 ° सेल्सियस सम्मको उच्च ज्वरो आउने, अनुहार सुन्निले र डेङ्गु ज्वरोको अन्य गैह्र-विशेष लक्षणहरू

देखिन्छन् । पछि, गम्भीर पेट दुखाइ, लगातार बान्ता हुने, तीव्र स्वांस-प्रस्वांस हुने, थकान, व्याकुलता र

र रक्तश्रावका संकेतहरू जस्तो छालामा चोटको दाग, नाक वा गीजाबाट रक्तस्राव, र सम्भावित आन्तरिक रक्तस्राव

जस्ता चेतावनीका संकेतहरू हुन सक्छन् । गम्भीर अवस्थाहरूमा रक्तसंचारको विफलता, आघात र मृत्यु पनि हुन सक्छ ।

प्रसारणको माध्यम

डेङ्गु ज्वरोको संक्रमण भएको पोथी एड्जेस लामखुट्टेको टोकाईबाट व्यक्तिहरूमा प्रसारित हुन्छ । डेङ्गु ज्वरोबाट पिडित बिरामीलाई टोकेको स्वास्थ्य लामखुट्टे पनि संक्रमित हुन्छ र यसले अन्य व्यक्तिहरूलाई टोकेर रोग फैलाउन सक्छ । यो रोग एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सिधै फैलिंदैन । हडकडमा, एड्जेस एजेण्टको मुख्य वाहक पाइन्डेन तर सामान्यतया हडकडमा एड्जेस एल्बोपिक्टस पाइन्छ, यसले पनि यो रोग फैलाउन सक्छ ।

उष्मायन अवधि

उष्मायन अवधि 3 - 14 दिनसम्म रहन्छ, सामान्यतया 4 - 7 दिन रहन्छ ।

व्यवस्थापन

डेङ्गु ज्वरो र गम्भीर डेङ्गुको लागि कुनै विशिष्ट उपचार छैन । धेरैजसो डेङ्गु ज्वरो आफैमा सीमित छ । असहजताबाट राहत दिनको लागि लक्षणात्मक उपचार दिइन्छ । गम्भीर डेङ्गुका बिरामीहरूलाई सहयोगी व्यवस्थापन सहित तुरुन्तै उपचार गरिनुपर्छ । उपचार को मुख्य आशय तरल मात्राको संचार कायम राख्नु हो । उपयुक्त र समयमै उपचार गर्दा, मृत्युदर 1% भन्दा कम हुन्छ ।

रोकथाम

हाल, हडकडमा स्थानीय रूपमा दर्ता गरिएको कुनै डेङ्गु खोप उपलब्ध छैन । हडकडमा सबैभन्दा राम्रो रोकथामको उपाय भनेको लामखुट्टे लागि प्रजनन गर्ने स्थानहरूलाई मद्दत गर्ने स्थीर पानीका श्रोतहरू हटाउने, र लामखुट्टेको टोकाईबाट जोगिनु हो ।

लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरूको रोकथाम गर्ने सामान्य उपायहरू

1. खुल्ला, हलुका-रंगको, लामो-बाहुला भएको कपडाहरू लगाउने, र खुल्ला भएका शरीर र कपडाका

भागहरूमा DEET-समावेश भएको किरा विकर्षकको प्रयोग गर्नुहोस् ।

2. बाहिरी गतिविधिहरूमा व्यस्त हुँदा थप निवारक उपायहरू गर्नुहोस् :

- सुगन्धित कस्मेटिक वा छालाको स्याहार गर्ने उत्पादनहरूको प्रयोगबाट जोगिनुहोस्
- निर्देशन अनुसार किरा विकर्षकहरूको पुनः प्रयोग गर्नुहोस्

3. विदेश यात्रा गर्दा विशेष टिप्पणीहरू :

- प्रभावित क्षेत्र वा देशहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्नु भन्दा कम्तिमा 6 हप्ता अगाडि डाक्टरसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, र लामखुटेको टोकाईबाट बच्न अतिरिक्त रोकथाम उपायहरू अपनाउनुहोस् ।
- यात्राको समयमा, यदि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, एउटा बोक्न मिल्ने ओछ्यानको झुल बोक्नुहोस् र यसमा पर्मेथ्रीन (एक कीटनाशक) लगाउनुहोस् । पर्मेथ्रीन छालामा लगाउनु हुँदैन । यदि सन्धो महशुस भएन भने तुरुन्तै चिकित्सा सहयोग लिनुहोस् ।
- वैज्ञानिक अध्ययनले संक्रमित व्यक्तिलाई लक्षणहरू नदेखिए पनि वा लक्षण देखिनु अघि लामखुटेको टोकाईबाट भाइरस सार्ने र रोगलाई फैलाउने देखाएको छ । तसर्थ, प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किने यात्रीहरूले हडकड आएपछि 14 दिनसम्म किरा विकर्षक लगाउनुपर्छ । यदि सन्धो महशुस नभएमा, जस्तो: ज्वरो आउने भएमा, तुरुन्त चिकित्सा सल्लाह लिनुपर्छ, र डाक्टरलाई यात्रा विवरण प्रदान गर्नुपर्छ ।

लामखुटे फैलनबाट रोक्न मद्दत गर्नुहोस्

1. स्थिर पानी जम्मा हुनबाट रोक्नुहोस्

- हप्ताको एक पटक फुलदानीमा पानी परिवर्तन गर्नुहोस्
- फूलको गमला तल प्लेटहरू प्रयोग गर्नबाट जोगिनुहोस्
- पानीको भाँडा कसेर ढक्कन लगाउनुहोस्
- एयर-कंडीशनरबाट चुहिएको पानी नजम्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्

- सबै टिन र बोतलहरू रद्दीटोकरीमा राख्नुहोस्
2. रोगको तत्वहरू र जलाशय नियन्त्रण गर्नुहोस्

- खाद्यान्नहरू राम्ररी भण्डारण गर्नुहोस् र फोहोर राम्ररी ठेगान लगाउनुहोस्

गर्भवती महिला र 6 महिना वा बढी उमेरका बच्चाहरूले DEET-समावेश भएको किरा विकर्षक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । लामखुटे द्वारा सर्ने रोगहरूको प्रकोप वा महामारी हुने जोखिम हुनसक्ने देशहरूमा वा क्षेत्रमा यात्रा गर्ने 2 महिना वा बढी उमेर भएका बच्चाहरूले 30% सम्म DEET-समावेश भएको किराहरूको विकर्षक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । किरा विकर्षकहरूको प्रयोग र अवलोकन गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरूको विस्तृत जानकारीको लागि, कृपया 'किराहरूको विकर्षक प्रयोग गर्ने सुझावहरू' सन्दर्भ गर्नुहोस् ।

लामखुटेको नियन्त्रण र रोकथामको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया खाद्य तथा पर्यावरण सरसफाई

विभाग (FEHD) को वेबसाइट

http://www.fehd.gov.hk/english/pestcontrol/handbook_prev_mos_breeding.html मा

जानुहोस्

22 अगस्ट 2018

22 August 2018