


What to do if you suspect yourself to be experiencing COVID-19 vaccine side effects?





- সাধারণ ভাবে, COVID-19 ভ্যাকসিনগুলির সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি হালকা ও সাময়িক। কেউ কেউ তীব্র, কিন্তু সাধারণত দুর্লভ প্রতিকৃল প্রভাব অনুভব করতে পারেন।
- ভ্যাকসিন গ্রহণের পর, আপনাকে পর্যবেক্ষণ অঞ্চলে 15-30 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।
- ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা ও অস্বস্তি কমানোর জন্য পরিষ্কার, ঠান্ডা, ভিজে কাপড় জড়িয়ে রাখতে পারেন। মৃদু ভাবে হাতের ব্যায়াম করুন।
- হালকা জুর থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট তরল পানীয় গ্রহণ করুন।







- কয়েকদিনের মধ্যে আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঠিক না হয়: বা
- আপনি আপনার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা লক্ষণগুলি নিয়ে চিন্তিত হন
- যদি আপনি চিকিৎসা চান তাহলে আপনার পেশাদার চিকিৎসককে আপনার ভ্যাকসিনেশনের যাবতীয় তথ্য এবং ভ্যাকসিনেশন রেকর্ড কার্ড দেখাবেন। তাঁরা আপনাকে পরামর্শ দেবে, আপনার অবস্থার খেয়াল রাখবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে স্বাস্থ্য দপ্তরে এ বিষয়ে খবর দেবে।



- Information on side effects can be found on the vaccination fact sheet or thematic website (covidvaccine.gov.hk)
- In general, common side effects of COVID-19 vaccines are usually mild and temporary. Some may experience more severe, but in general rare, adverse effects.
- After receiving vaccination, you will be required to stay in observation area for 15-30 mins.



- · To reduce discomfort from mild fever, drink plenty of fluids.
- Seek advice from your doctor or other healthcare professionals (e.g. dentists, pharmacists, nurses and Chinese medicine practitioners) if:
 - the pain or redness at the injection site increases after 24 hours from injection; or
 - your side effects do not seem to be going away in a few days; or
 - your side effects or symptoms are worrying you





















(Bengali Version)

mins





Bahasa Indonesia

Tagalog

සිංහල භාෂාව

বাংলা ভাষা

Tiếng Việt









