



स्तन क्यान्सर रोकथाम र स्क्रीनिंग

हडः कडःमा महिलाहरू सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सर स्तन क्यान्सर हो। यो स्तन तिस्स्यूहरूमा हुने एक घातक ट्यूमर हो।

स्तन जागरूकता

प्रारम्भिक चरणमा स्तन क्यान्सरका लक्षण सजिलै देख्न सकिँदैन।

प्रत्येक महिलाले आफ्नो स्तनप्रति सचेत हुनुपर्दछ, यसको सामान्य रूपसँग परिचित हुनुहोस् र समय-समयमा आफ्नो स्तनको अनुभव गर्नुहोस्।

दैनिक गतिविधिहरू (उदाहरणः स्नान, ड्रेसिंग र बडी लोशन लगाउँदा) को क्रममा निम्न असामान्य स्तनको बारे सजग हुनुहोस्:

- स्तन गिर्खा
 - स्तनको बनावट वा आकारमा परिवर्तन हुनु
 - स्तन वा स्तनको टुप्पाका छालामा परिवर्तन (उदाहरणः रातो, खस्रो, मोटो, वा "सुन्तला रंगको-छाला" को उपस्थिति)
 - स्तनको टुप्पो चारै तिर खटिरा आउने, भित्रतिर फर्कने, वा डिस्चार्ज हुने
 - स्तन वा काखीमा नयाँ र लगातार असुविधा वा दुखाइ
 - काखीमा नयाँ डल्ला वा मोटाई
- यदि तपाईंले कुनै पनि परिवर्तन फेला पार्नुभयो भने डाक्टरसँग तुरुन्त परामर्श गर्नुहोस्।

स्तन क्यान्सर रोकथाम

स्तन क्यान्सर हुने जोखिम कम गर्न:

- नियमित शारीरिक गतिविधि गर्नुहोस्
- स्वस्थ शरीरको वजन र कम्मर परिधि कायम राख्नुहोस्
- रक्सी सेवनबाट बच्नुहोस्
- संभव भएसम्म लामो अवधिसम्म बच्चालाई स्तनपान गराउनुस्

स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंग

स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंग भनेको लक्षण देखा पर्नु अघि स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउनको लागि हो ताकि महिलाले अगाडि नै उपचार प्राप्त गर्न सकुन्।

क्यान्सर रोकथाम र स्क्रीनिंगमा सरकारको क्यान्सर विज्ञ विशेषज्ञ कार्य समूहले स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंगको लागि जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाउन सिफारिस गर्दछ र विभिन्न जोखिम प्रोफाइलहरूका महिलाको लागि स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंगको लागि सिफारिश निर्माण गर्दछ जुन निम्न अनुसार छन्:

A. उच्च जोखिमका महिलाहरू

(उदाहरण: स्तनको क्यान्सर वा ओभेरियाली क्यान्सरको कडा पारिवारिक इतिहासको साथ पुष्टि गरिएको *BRCA1* वा *BRCA2* जिन म्युटेसनहरूका वाहकहरू, आदि)

- चिकित्सकबाट सल्लाह खोज्न र **प्रत्येक वर्ष ममिरोग्राफी स्क्रीनिंग गर्न सिफारिश गरिन्छ**

B. मध्यम जोखिमका महिलाहरू

(अर्थात् केवल एक प्रथम-डिग्री महिला नातेदार जसको 50 वर्ष वा सो भन्दा अधिको उमेरमा स्तन क्यान्सरको उपचार भएको पारिवारिक इतिहासको, अथवा 50 वर्षको उमेर पछि 2 जना प्रथम-डिग्री महिला नातेदारहरूको स्तन क्यान्सरको उपचार भएको पारिवारिक इतिहास)

- डाक्टरबाट सल्लाह लिन र **प्रत्येक 2 वर्षमा ममिरोग्राफी स्क्रीनिंग सिफारिश गरिन्छ**

C. सामान्य जनसंख्याका अन्य महिलाहरू

- **निजीकृत जोखिम कारकहरूको निश्चित संयोजन** भएका **44-69 उमेरका** स्तन क्यान्सरको उच्च जोखिम हुने महिलाहरूलाई **प्रत्येक 2 वर्षमा ममिरोग्राफी स्क्रीनिंग गर्न** र डाक्टरको सल्लाह लिन सिफारिस गरिन्छ
- स्तन क्यान्सर विकास हुने जोखिम अनुमान गर्न स्थानीय महिलाहरूका लागि **जोखिम मूल्यांकन उपकरण**¹ प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ ताकि महिलाले स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङको लागि सूचित निर्णय गर्न आफ्नो डाक्टरसँग काम गर्न सकून्। मूल्यांकन उपकरण www.cancer.gov.hk/bctool मा क्यान्सर अनलाईन श्रोत हबमा पाउन सकिन्छ।

स्तन क्यान्सर स्क्रिनिंग विचार गर्ने महिलाहरूले आफ्ना डाक्टरसँग सम्भावित फाइदाहरू र हानीमा छलफल गर्नुपर्दछ।

स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंग सिफारिशहरू www.cancer.gov.hk/breastcancer मा हेर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य विभाग
2022 मा प्रकाशित

¹ हङ कङ विश्वविद्यालयद्वारा विकसित