

信使核糖核酸新冠疫苗
COVID-19 mRNA Vaccine

Comirnaty 「復必泰」

(BNT 162b2)

14 जून 2021 देखि,
Comirnaty 12 वर्ष उमेरका र माथिका युवा र किशोरकिशोरीहरुलाई दिइन्छ ।

इंजेक्शन साइट दर्द और सूजन, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, दस्त और बुखार जैसे बहुत ही सामान्य दुष्प्रभावों के लिए, इनमें से कुछ दुष्प्रभाव वयस्कों की तुलना में 12 से 15 साल के किशोरों में थोड़ा अधिक बार होते थे।

मायोकार्डिटिस (हृदय की मांसपेशियों की सूजन) और पेरिकार्डिटिस (हृदय की बाहरी परत की सूजन) के बहुत दुर्लभ मामलों को Comirnaty टीकाकरण के बाद रिपोर्ट किया गया है। मामले मुख्य रूप से टीकाकरण के बाद दो सप्ताह के भीतर हुए हैं, ज्यादातर दूसरे टीकाकरण के बाद, और ज्यादातर युवा पुरुषों में हुआ।

टीकाकरण के बाद, आपको मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस के संकेतों जैसे सांस की तकलीफ, घबराहट और सीने में दर्द के प्रति सचेत रहना चाहिए, और ऐसा होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

किशोरों और युवा वयस्कों को Comirnaty टीकाकरण के बाद एक सप्ताह तक कठिन व्यायाम से बचना चाहिए।

From 14 June 2021,
Comirnaty is given to adults and adolescents from 12 years of age and older.

For very common side effects, such as injection site pain and swelling, tiredness, headache, muscle pain, chills, joint pain, diarrhoea and fever, some of these side effects were slightly more frequent in adolescents 12 to 15 years than in adults.

Very rare cases of myocarditis (inflammation of the heart muscle) and pericarditis (inflammation of the lining outside the heart) have been reported after vaccination with Comirnaty. The cases have primarily occurred within two weeks following vaccination, more often after the second vaccination, and more often occurred in younger men.

Following vaccination, you should be alert to signs of myocarditis and pericarditis, such as breathlessness, palpitations and chest pain, and seek immediate medical attention should these occur.

Adolescents and young adults should avoid strenuous exercise for one week after Comirnaty vaccination.

संस्करण दिनांक: 6 अगस्त 2021 | Version date: 6 August 2021

