

監測及流行病學處



Surveillance
And
Epidemiology
Branch

本署檔號 Our Ref.: (6) in DH SEB CD/8/9/1

來函檔號 Your Ref.:

電 話 TEL.:

傳 真 FAX No.:

校長 / 主任 / 老師 :

預防急性結膜炎（紅眼症）

急性結膜炎是一種傳染性高的疾病，主要由細菌及病毒引致。徵狀包括眼睛刺癢、流眼水、眼睛疼痛及紅腫。急性結膜炎個案全年均可發生，而夏季乃是其中一個院舍爆發急性結膜炎的高峯期，務請各位注意。傳播途徑主要經接觸病人眼睛或上呼吸道的分泌物、受污染的手指、衣服和其他物品，包括與別人共用眼部化妝用品和眼科藥物，均可能傳播病菌。5歲以下兒童最常受感染。染上急性結膜炎人士只要得到適當治療，便可以於一至兩星期內痊癒。如發現有急性結膜炎病徵，應及早就醫及避免到游泳池。預防急性結膜炎最重要是注重個人衛生。

預防急性結膜炎，請注意以下的要點：

1. 學校應與家長保持良好溝通，並協助他們明白當學童有急性結膜炎病徵時，必須留在家中，以避免將疾病傳染給其他學童。
2. 保持良好的個人衛生習慣：避免與人共用毛巾或洗手間用品，避免用手觸摸眼睛，觸摸眼睛前後都要洗手，避免與別人共用眼藥水、眼部藥物、眼部化妝品和其他可能接觸眼睛的用品。學校應經常提醒學童注意個人衛生。
3. 提醒員工留意學童在進入學校前有沒有出現紅眼症徵狀，勸喻家長陪同病童返家。若情況未能許可，應安排病童與其他學童分隔，以避免急性結膜炎的傳播。
4. 遵照「幼兒中心、幼稚園、學校預防傳染病指引」保持幼兒中心 / 幼稚園的環境衛生，特別注意清潔洗手間、玩具，及處理排泄物和分泌物的正確程序。



衛生防護中心乃衛生署

轄下執行疾病預防
及控制的專業架構

The Centre for Health
Protection is a
professional arm of the
Department of Health for
disease prevention and
control

如察覺出現急結膜炎症狀的兒童人數增加，請儘早與衛生防護中心中央呈報辦公室聯絡(傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772)。衛生防護中心會就如何處理這些個案提供指引，並採取適當控制措施。

如欲獲取更多資料，可瀏覽衛生防護中心網站(網址為http://www.chp.gov.hk/content.asp?lang=tc&info_id=18&id=24&pid=9)。有關的「幼兒中心、幼稚園、學校預防傳染病指引」可經以下網址下載：
<http://www.chp.gov.hk/files/pdf/Guild-Booklet-Chi.pdf>

衛生署衛生防護中心
監測及流行病學處
社會醫學顧問醫生(傳染病)

(曾浩輝醫生)



2005年6月14日