

# 麻疹疫苗 - 知多一點點



出生年份		政府提供的含麻疹疫苗	
		第一劑	第二劑
於1967年前出生*		未有提供	
於1967至1988年出生	所有人士 (不包括於1996/97學年或以後就讀小六; 或於1997/98學年或以後就讀小一)	於六個月至一歲接種 AMV	請參考個人免疫接種 記錄#
	於1996/97學年或以後 就讀小六	於一歲接種AMV	於小六在學校接種MMR#
	於1997/98學年或以後 就讀小一	於一歲接種AMV	於小一在學校接種MMR
於1989年或以後出生	於1997/98學年以前 就讀小一	於一歲接種MMR	於小六在學校接種MMR#
	於1997/98學年或以後 就讀小一	於一歲接種MMR	於小一在學校接種MMR

AMV: 麻疹疫苗

MMR: 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗



\* 1967年前在本港出生人士可能曾染麻疹，預料對麻疹有抗體。

# 政府於1997年7至11月期間推行「麻疹疫苗加強劑注射運動」，1978至1996年出生人士透過該計劃可能已接種一劑MMR混合疫苗。此計劃為未曾接受兩劑MMR混合疫苗或AMV的1至19歲兒童和青少年（1978至1996年出生）注射一劑MMR混合疫苗。

## 注意：

- 健康的人士按建議接種麻疹疫苗後一般可獲長期，甚至終生保護。接種一劑MMR混合疫苗，預防麻疹效果可達93%，接種兩劑疫苗後預防效果更可達97%。
- 如你對麻疹免疫力有疑問或不確定曾否感染麻疹，應就接種麻疹疫苗事宜諮詢醫生意見。
- 接種疫苗後身體約需兩星期產生麻疹免疫力。

