

本署檔號 Our Ref. : (88) in DH CDB/8/35/1 Pt.4

致：聘用外籍家庭傭工的僱主

先生/女士：

外籍家庭傭工接種疫苗以預防麻疹

衛生署衛生防護中心希望閣下能鼓勵受僱外籍家庭傭工(外傭)完成接種預防麻疹疫苗，以保障外傭健康及保護社區。

麻疹是一種疫苗可預防的傳染病，在全球許多地方仍很常見。由於全球麻疹疫苗接種率仍未恢復至新冠疫情前的水平，近幾個月來北美和歐洲的麻疹個案大幅增加，受影響大部分為未接種疫苗的人士。在東南亞一些麻疹流行國家，例如菲律賓、印尼和越南等地，過去六個月亦已錄得數千宗病例。

香港一直維持非常高的麻疹疫苗接種率，目前本地出現大型爆發的風險偏低。然而，由於全球麻疹疫情升溫，部分未完成接種麻疹疫苗的外傭或有機會在家鄉受感染後把麻疹傳給僱主及其家人，尤其是未適齡接種疫苗的嬰兒。

為了保障你家人的健康及預防麻疹感染和在社區傳播，我們希望閣下幫忙通知你的外傭在來港工作前先在當地接種疫苗。一般而言，以下人士可視為對麻疹未具備免疫力：

- (i) 過往未曾經化驗確診感染麻疹；及
- (ii) 未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、或接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士。



我們建議閣下要求你的外傭提供具備麻疹免疫力的證明文件或已接種兩劑含麻疹疫苗的記錄。任何對麻疹未具備免疫力的外傭應在來港工作前接種兩劑含麻疹的疫苗。

部分僱傭機構或會為外傭安排入職前驗身。我們強烈建議你向僱傭機構查詢詳情並考慮把麻疹免疫力評估加入為你外傭的驗身項目。如你的外傭對麻疹尚未具備免疫力，請建議他/她盡快完成疫苗接種。本港不少私家診所提供麻疹疫苗接種服務。

本港現時沒有供應單價麻疹疫苗，使用的含麻疹疫苗為「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹(MMR)混合疫苗」，可同時預防流行性腮腺炎及德國麻疹。孕婦感染德國麻疹更有機會影響胎兒。有關麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹的詳細資料請參閱附件單張。

我們期望與閣下攜手保障社區健康，共同對抗疫苗可預防疾病。

衛生防護中心總監



(歐家榮醫生代行)

二零二六年三月二十五日

建議外籍家庭傭工接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗

麻疹是一種由病毒引起傳染性極高的疾病，可傳染給任何未有免疫力人士，更可引致嚴重後果甚至死亡。另一方面，孕婦如果在懷孕首三個月感染風疹（又稱德國麻疹），可導致成長中的胎兒出現異常情況（先天性風疹綜合症）。患者一旦感染麻疹或風疹可能會傳染給親友、僱主及其家庭成員，尤其是未適齡接種疫苗的嬰兒。我們留意到部分外籍家庭傭工抵港工作前可能未曾在他們的出生地接種麻疹及德國麻疹疫苗。接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR 疫苗）可以有效預防麻疹、流行性腮腺炎及風疹。我們建議為外籍家庭傭工接種 MMR 疫苗，以保障他們及其他人士。

一般而言，以下人士可視為對麻疹/風疹未具備免疫力：(i) 過往未曾經化驗確診感染麻疹/風疹；及 (ii) 未完成麻疹/德國麻疹接種、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士。為預防疾病及社區傳播，我們建議所有對麻疹或風疹未具備免疫力的外籍家庭傭工應在抵港工作前接種 MMR 疫苗。

如欲索取更多接種 MMR 疫苗的資料，可瀏覽衛生署家庭健康服務的網頁：http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/486.html。

麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的傳染病，經空氣中的飛沫或直接接觸病人呼吸道分泌物而傳染，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。受感染的人初時會疲倦、發燒、咳嗽、眼紅及口腔內出現白點，三至七日後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，嚴重者的中耳、肺部及腦部會受影響，引致併發症甚至死亡。



流行性腮腺炎

流行性腮腺炎由流行性腮腺炎病毒所引起，有時會影響唾腺，有時亦會影響神經組織。病毒透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的唾液傳播。病徵包括發燒、唾腺腫痛(通常集中在兩頰)，間中或出現失聰或腦部受感染等併發症。青少年染上流行性腮腺炎可能會出現睪丸或卵巢感染，影響生育能力。

風疹

風疹，又稱「德國麻疹」，是由風疹病毒引起的傳染病。風疹可透過接觸病人的鼻咽分泌物而傳播，所以接觸飛沫或直接與病人接觸均可能被感染。一般病徵溫和，病童通常會發燒、頭痛、全身出疹、耳後和頸部的淋巴腺腫脹。有時可能毫無症狀，染上了也不自覺。併發症包括關節炎、血小板減少和腦炎。

風疹可令成長中的胎兒出現異常情況。孕婦如果在懷孕首三個月感染風疹，所誕下的嬰兒可能會患上先天性風疹綜合症，導致失聰、眼部缺陷、心臟畸形及智力發展遲緩。

衛生署衛生防護中心
二零二六年三月