

本署檔號 Our Ref.: (57) in DH SEB CD/8/9/1

來函檔號 Your Ref.:

電 話 TEL.:

傳 真 FAX No.:

各位校長 / 主任 / 老師 :

預防急性結膜炎感染（紅眼症）

衛生防護中心的最新監測數據顯示，定點私家診所的急性結膜炎平均求診比率由截止至今年九月四日一週內每千宗診症佔 2.4 宗，增加至截至今年九月十一日一週內每千宗診症有 3.1 宗。同期定點普通科門診急性結膜炎的求診比率由每千宗診症佔 1.1 宗，增至每千宗診症 1.3 宗。本中心現提醒各位要提高警覺並採取措施預防急性結膜炎在 貴學校／機構內傳播。

急性結膜炎是一種傳染性高的疾病，主要由細菌及病毒引致。徵狀包括眼睛刺癢、流眼水、眼睛疼痛及紅腫。任何人士均有機會染上此病，尤以五歲以下兒童最常受到感染。院舍爆發急性結膜炎多見於夏季。患者發炎期間能把結膜炎傳播。直接接觸病人眼睛或上呼吸道的分泌物，或透過沾污了的手指、衣服和其他物品，包括與別人共用眼部化粧用品或外用眼科藥物，均可致病。此外，游泳人士於受污染的水源游泳，也可感染結膜炎。如發現有急性結膜炎病徵，應及早就醫及避免返回學校。預防急性結膜炎最重要是注重個人衛生。

預防急性結膜炎，學校應注意以下的要點：

1. 提醒學童/員工保持良好的個人衛生習慣，包括避免與人共用毛巾或洗手間用品；避免用手觸摸眼睛；觸摸眼睛前後都要洗手；及避免與別人共用眼藥水、眼部藥物、眼部化妝品和其他可能接觸眼睛的用品。
2. 如發現學童出現急性結膜炎徵狀，應勸喻他們在痊癒前避免返回學校。若情況未能許可，應安排病童與其他學童分隔，以避免急性結膜炎的傳播。
3. 與家長保持良好溝通，並協助他們明白當學童有急性結膜炎病徵時，應盡快看醫生；適當處置沾了病人眼部或呼吸道分泌的物品；避免使用泳

池；避免用手觸摸受感染的眼睛；及經常用肥皂及清水洗淨雙手。

4. 學校應遵照「學校 / 幼稚園 / 幼稚園暨幼兒中心 / 幼兒中心預防傳染病指引」(http://www.chp.gov.hk/files/pdf/School_full_tc_20090115.pdf)，保持幼兒中心/學校的環境衛生，特別注意清潔洗手間、玩具，及處理排泄物和分泌物的正確程序。

如察覺出現急結膜炎症狀的學童人數增加，請儘早通知衛生防護中心中央呈報報公室(傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772)。衛生防護中心會就如何處理這些個案提供指引，並建議適當控制措施。如欲獲取更多資料，請瀏覽衛生防護中心網站(網址為<http://www.chp.gov.hk>)。

衛生署衛生防護中心
署理社會醫學顧問醫生(傳染病)



(黃宏醫生)

2010年9月16日