

เมลิออดิโดซิส

เป็นเหตุเป็นผล ตัวแทน

โรคเมลิออดิโดซิสเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เบอรัคโฮลเดอเรีย ซูโดแมลไล ซึ่งแพร่กระจายในดินและน้ำโคลน อาจเกิดได้ทั้งคนและสัตว์ เช่น แกะ สุกร แมว สุนัข เป็นต้น

คุณสมบัติทางคลินิก

อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเฉพาะจุดหรือบวม แผลเปื่อย อาการเจ็บหน้าอก ไอ ฮีโมปติซิส และบวมของต่อมทอนซิลในภูมิภาค

โหมดการส่งข้อมูล

มนุษย์สามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสกับดินและน้ำผิวดินที่ปนเปื้อน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกลอกหรือบาดแผลที่ผิวหนัง) การสูดดมฝุ่นละออง/ละอองน้ำที่ปนเปื้อน และการกลืนกินน้ำที่ปนเปื้อน การติดต่อจากคนสู่คนเป็นเรื่องที่หาได้ยาก แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อ

เบอรัคโฮลเดอเรีย ซูโดแมลไล ในดินและน้ำโคลนอาจสัมผัสกับพื้นดินหลังพายุไต้ฝุ่นหรือพายุ และแบคทีเรียจะแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นเมื่อมีลมและพายุรุนแรง ด้วยเหตุนี้ กรณีการติดเชื้อจึงมักเกิดขึ้นหลังพายุไต้ฝุ่นหรือพายุ

กลุ่มเสี่ยงสูง

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคตับ โรคไต มะเร็ง หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรค

ระยะฟักตัว

ระยะฟักตัวจะแตกต่างกันไปโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 2 ถึง 4 สัปดาห์แต่อาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 วันถึงไม่กี่ปี

การจัดการ

เมลิออดิโดซิส สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ การรักษาระยะยาวอาจจำเป็นสำหรับกรณีการติดเชื้อเรื้อรังบางอย่าง

การป้องกัน

ไม่มีวัคซีนสำหรับ เมลิอิดิโดซิส เพื่อป้องกันโรค เมลิอิดิโดซิส ผู้คนควรใช้มาตรการต่อไปนี้:

- ✓ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินที่ปนเปื้อน
- ✓ สวมชุดป้องกันหรือรองเท้าที่เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจสัมผัสกับดินหรือน้ำ เช่น ใช้ถุงมือและสวมรองเท้าบูต บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงอาจพิจารณาสวมหน้ากากผ้าตัดเพิ่มเติม
- ✓ ล้างหรืออาบน้ำหลังจากสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อน
ปล่อยให้ น้ำประปาทำงานเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนที่จะใช้สำหรับการแปรงฟัน ล้างหน้าหรืออาบน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
- ✓ ทำความสะอาดบาดแผลโดยเร็วที่สุดและปิดบาดแผลหรือเส็มหญ้าด้วยผ้าปิดแผลกันน้ำ
- ✓ ล้างมือด้วยสบู่เหลวและน้ำหลังจากจัดการกับดินหรือสวน
- ✓ เมลิอิดิโดซิส
สามารถแพร่กระจายได้โดยดินและน้ำที่ปนเปื้อนในระหว่างและหลังพายุไต้ฝุ่นและพายุ
ไม่ว่าจะปฏิบัติได้ให้อยู่ในร่มระหว่างพายุไต้ฝุ่นและพายุหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
ที่อาจเกิดขึ้นและไม่ลุยหรือสัมผัสกับน้ำและดินโคลนนอกจากนี้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงควรหลีกเลี่ยง
เส้นทางใกล้กับท่อระบายน้ำที่มีน้ำฝนซึ่งอาจเกิดละอองลอยจากน้ำที่ปนเปื้อนหากเป็นไปได้
ว่าการสัมผัสกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงควรสวมหน้ากากถุงมือและรองเท้าผ้า
ตัด
- ✓ ปฏิบัติตามสุขอนามัยของอาหารและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่ไม่ต้มหรือน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด
- ✓ นักท่องเที่ยวสามารถติดโรคได้ทางกีฬาทงน้ำ
สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแหล่งน้ำ (เช่น แม่น้ำ บ่อน้ำ
หรือทะเลสาบ) ที่อาจปนเปื้อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด

ไปที่เว็บไซต์ www.chp.gov.hk ของศูนย์คุ้มครองสุขภาพ

วันที่ของเวอร์ชัน: 18 กันยายน 2023 (18 September 2023)