

給主辦大型集會的單位預防中東呼吸綜合症的健康指引

衛生署建議所有大型集會的主辦單位工作人員於活動場地採取下列預防措施，以儘量減低感染和傳播中東呼吸綜合症的風險。

疾病資訊

<https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/26528.html>

受影響地區

請瀏覽衛生防護中心網頁，查閱最新有關受影響地區的資訊：

http://www.chp.gov.hk/files/pdf/distribution_of_mers_cases_ch.pdf

I. 在大型集會前

主辦單位在大型集會前為參加者提供相關的資訊

- 透過各種渠道如電子郵件或網站提供相關的資訊予所有參加者，例如中東呼吸綜合症健康教育單張。中東呼吸綜合症健康教育單張可於衛生防護中心網頁下載：https://www.chp.gov.hk/files/her/mers_pamphlet_chi.pdf
- 提醒參加者，如在過去 14 天內曾居住或到訪受影響之地區，並出現發燒及／或呼吸道感染病徵如咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛或肌肉疼痛，應戴上外科口罩，並儘早求醫，不應參加活動。

II. 在大型集會進行期間

在會場提供足夠設施

- 於會場內顯眼處，張貼手部衛生、咳嗽禮儀及中東呼吸綜合症的海報，和提供相關單張以提高參加者對預防中東呼吸綜合症的意識。相關的海報及單張可於衛生防護中心網頁下載：<https://www.chp.gov.hk/tc/resources/464/26528.html>
- 提供充足潔手設施，如 70 - 80% 酒精搓手液於公共地方，尤其於接待處及會場內。
- 提供外科口罩給有呼吸道感染病徵的參加者佩戴。

保持環境衛生

- 保持空氣流通。
- 保持環境清潔。應每天以適當消毒劑清潔和消毒經常接觸的表面、傢俬、共用物品和地板最少一次。可使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（以 10 毫升含 5.25% 次氯酸鈉漂白水混和於 990 毫升清水內）清洗非金屬表面，待乾後再用清水清洗。金屬表面則可用 70% 火酒清潔消毒。

- 當物品表面或地面被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄抹布清除可見的污垢，然後再用適當的消毒劑清潔消毒受污染及其附近的地方，非金屬表面可使用 1 比 49 稀釋家用漂白水（以 10 毫升含 5.25% 次氯酸鈉漂白水混和於 490 毫升清水內）作清潔消毒，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70% 火酒清潔消毒。
- 應保持廁所清潔和乾爽。
- 提供視液及即棄抹手紙作潔手用途。
- 確保沖廁系統及乾手機運作正常。

在會場設置隔離措施

- 應預備指定區域及相關物品如體溫計，以供身體不適的參加者使用。
- 應向員工提供適當個人防護裝備以照顧不適者或清潔受污染區域，包括外科口罩、保護衣、手套、眼部防護（眼罩／面罩）及保護帽（可選用）。

照顧曾到訪受影響地區，並出現不適的參加者和／或其同行者

- **求診前**
 - 安排不適的參加者和／或其同行者於指定區域內等候，並佩戴外科口罩。
 - 職員應避免接觸不適的參加者和／或其同行者。
 - 如職員須要接觸感到不適的參加者和／或其同行者，他／她應佩戴適當個人防護裝備。
 - 為不適的參加者和／或其同行者量度體溫並保留紀錄。
- **安排求診**
 - 建議及協助不適的參加者和／或其同行者求診。如有需要，致電 999，並告知相關人員有關參加者和／或其同行者的情況及外遊紀錄，以便安排到急症室診治。
- **善後處理**
 - 照顧不適的參加者和／或其同行者後，應小心卸除個人防護裝備，並棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。
 - 負責清潔的員工應佩戴適當個人防護裝備，包括外科口罩、保護衣、手套、眼部防護（眼罩／面罩）及保護帽（可選用）。清潔完畢後，員工必須小心卸除個人防護裝備，並棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。
 - 當物品表面或地面被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄抹布清除可見的污垢，然後再用適當的消毒劑清潔消毒該處及其附近地方，非金屬表面可使用 1 比 49 稀釋家用漂白水

(以 10 毫升含 5.25% 次氯酸鈉漂白水混和於 490 毫升清水內) 作清潔消毒，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70% 火酒清潔消毒。

- 建議主辦單位負責人保留一份詳列所有參加者和／或其同行者（如可行）及員工當值表的名單，並包括個人及聯絡資料，以便需要時作追蹤接觸者之用。

詳情

- 請瀏覽衛生防護中心專題網頁：<https://www.chp.gov.hk/tc/features/26511.html>

衛生防護中心

二零一八年三月

(二零一八年三月二十九日最後更新)