



Giữ tay sạch
ਰੱਖ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
Keep hands clean



Che mũi và miệng khi hắt hơi hoặc ho
ਛੱਕ ਜਾਂ ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ
Cover your nose and mouth while sneezing or coughing



Tránh dùng chung các vật dụng cá nhân như dụng cụ ăn uống và khăn

ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

Avoid sharing personal items such as eating utensils and towels

Phòng chống sốt đỏ tưa

(Vietnamese Version)

ਸਕਾਰਲੇਟ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

(Punjabi Version)

Prevention of Scarlet Fever

Nếu bạn bị đau họng, sốt, nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa hoặc nổi mẩn da, hãy nhanh chóng tìm lời khuyên y tế

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

If you have sore throat, fever, headache, nausea, vomiting or skin rash, seek medical advice promptly

Trẻ em bị bệnh ban đỏ nên hạn chế đến trường hoặc nơi giữ trẻ cho đến khi hết sốt và đã được điều trị bằng kháng sinh trong ít nhất 24 giờ

ਲਾਲ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Children suffering from scarlet fever should refrain from attending school or child care setting until fever has subsided and they have been treated with antibiotics for at least 24 hours



Sửa đổi v ào th 6 năm 2024
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ