

預防肺炎球菌感染 長者接種 肺炎球菌疫苗



衛生防護中心



衛生署

1. 為什麼長者須接種肺炎球菌疫苗？

雖然肺炎球菌一般只會引起較輕微的病症如竇炎和中耳炎，但它亦可引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病如入血性肺炎、敗血病和腦膜炎。長者患上侵入性肺炎球菌疾病後病情通常較為嚴重。因此，接種疫苗對長者尤為重要。

2. 長者應接種哪種肺炎球菌疫苗？

政府會為65歲或以上的合資格香港居民免費或資助提供以下的肺炎球菌疫苗接種：



沒有高風險情況*的長者：

- 如果從未接種肺炎球菌疫苗，會獲接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗）；
- 如果曾接種二十三價疫苗或十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗），便不需要再補種。

有高風險情況*的長者：

- 如果從未接種肺炎球菌疫苗，會獲接種一劑十三價疫苗，一年後再接種一劑二十三價疫苗；
- 如果已經接種二十三價疫苗，則應在上一次接種二十三價疫苗的一年後接種一劑十三價疫苗；
- 如果已經接種十三價疫苗，則應在上一次接種十三價疫苗的一年後接種一劑二十三價疫苗。

3. 長者可以到哪裡接種肺炎球菌疫苗？

- 長者可到已登記參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所，獲政府資助接種肺炎球菌疫苗。2019/20年度，每劑二十三價疫苗的資助額為港幣250元，而每劑十三價疫苗的資助額為港幣730元。醫生可能會額外收費。如果醫生同時參與「長者醫療券計劃」，長者可使用醫療券支付接種肺炎球菌疫苗的醫生收費。
- 如長者屬以下情況，可透過「政府防疫注射計劃」於公營診所免費接種肺炎球菌疫苗：
 - 有高風險情況*並在公立診所求診或屬醫院管理局轄下醫院的住院病人；或
 - 正領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書。



長者前往接種疫苗時，須要帶備香港居民身份證明文件及所有的疫苗接種記錄（針卡），因為醫生在提供合適疫苗前需參考長者的疫苗接種記錄。



4. 接種「二十三價肺炎球菌多醣疫苗」可能會出現甚麼不良反應？

「二十三價肺炎球菌多醣疫苗」已獲證實安全。常見不良反應包括接種疫苗部位可能在接種後短時間內出現輕微腫脹及疼痛，但大多會在兩天內自然消退。發燒、肌肉痛及其他更嚴重的局部反應並不常見。



5. 接種「十三價肺炎球菌結合疫苗」可能會出現甚麼不良反應？

「十三價肺炎球菌結合疫苗」已獲證實安全。常見不良反應包括接種疫苗部位可能在接種後短時間內出現輕微腫脹及疼痛，但大部分反應在兩天內會自然消退。一些可能會出現輕微發熱、疲勞、頭痛、發冷或肌肉疼痛。在針口位置出現嚴重的疼痛或移動手臂困難是非常罕見的。



* 高風險情況包括：

- 曾患侵入性肺炎球菌病、腦脊液滲漏或裝有人工耳蝸
- 長期心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病
- 新陳代謝疾病包括糖尿病或肥胖（體重指數30或以上）
- 免疫力弱（因情況如無脾臟、人類免疫力缺乏病毒感染/愛滋病或癌症/類固醇治療引致）
- 長期神經系統疾病致危及呼吸功能、難於處理呼吸道分泌物、增加異物入肺風險或欠缺自我照顧能力



如想更詳細瞭解肺炎球菌疫苗和各項疫苗計劃，請致電
2125 2125
或瀏覽衛生防護中心網站
www.chp.gov.hk



疫苗接種計劃