

(1) 季節性流感疫苗

在院舍防疫注射計劃2023/24季度使用的以雞胚生產的四價的疫苗包括以下成分：

- 類甲型/維多利亞/4897/2022 (H1N1)pdm-09 病毒
- 類甲型/達爾文/9/2021 (H3N2)病毒
- 類乙型/奧地利/1359417/2021 (B/ Victoria 譜系) 病毒
- 類乙型/布吉/3073/2013 (B/ Yamagata 譜系) 病毒

在 2023/24 計劃下，政府所提供的疫苗為滅活流感疫苗，此疫苗能同時用作肌肉或皮下注射。

製劑

年齡組別	劑量	裝備
6 個月或以上	0.5 毫升疫苗	一支預先裝滿連針咀的注射器

注射劑量方法和部位*

醫生會為接種人士於上臂三角肌中央部位的肌肉內／大腿前外側（嬰幼兒）進行肌肉注射。至於出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生。如有需要，醫生可為個別院友／職員作皮下注射。

劑量	劑次
0.5 毫升疫苗	—*

* 為確保對季節性流感產生足夠的免疫力，凡 9 歲以下從未接種過季節性流感疫苗的兒童，建議在 2023/24 季度應接種兩劑季節性流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間應至少相隔 4 個星期。過去曾接種過任何季節性流感疫苗的 9 歲以下兒童，在 2023/24 季度只須接種一劑季節性流感疫苗。凡 9 歲或以上人士只須每年接種一劑季節性流感疫苗。

誰不宜接種滅活季節性流感疫苗？

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士，都不宜接種滅活流感疫苗。對雞蛋有輕度過敏的人士如欲接種流感疫苗，可於基層醫療場所接種滅活流感疫苗，而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。流感疫苗內雖含有卵清蛋白（即雞蛋白質），但疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極低，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。至於出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生。如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。