

風疹（德國麻疹）疫苗 · 知多一點點



出生年份	性別	政府提供的含德國麻疹疫苗 (風疹又稱德國麻疹)
於1967年前出生或 所有不屬於以下類別人士	所有人士	未有提供
於1967至 1988年出生	女士	於小六在學校接種ARV
	男士	請參考個人免疫接種記錄 ^{#†}
	所有人士	於小六在學校或經 1997年或2019至2020年期間的 麻疹疫苗補種計劃接種MMR混合疫苗 ^{#^†}
於1989年至 2018年6月30日出生	所有人士	於一歲接種MMR及在不同年歲 接種第二劑MMR/MMRV ^{#†^**}
於2018年7月1日 或以後出生	所有人士	於一歲接種MMR及 在十八個月時接種MMRV‡

ARV: 德國麻疹疫苗

MMR: 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗

MMRV: 麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗

政府於1997年7至11月期間推行「麻疹疫苗加強劑注射運動」，1978至1996年出生人士透過該計劃可能已接種一劑MMR混合疫苗。此計劃為未曾接受兩劑MMR混合疫苗或AMV的1至19歲兒童和青少年（1978至1996年出生）注射一劑MMR混合疫苗。

† 政府於2019年7月至2020年9月期間推行「一次性免費麻疹疫苗補種計劃」，1967年至2002年出生並對麻疹未有免疫力的成年香港居民（未曾於一歲或以後接種兩劑麻疹疫苗，及未有經化驗證明曾感染麻疹）透過該計劃可能已接種一劑或兩劑MMR混合疫苗。

^ 於1997/98學年或以後就讀小六的人士可能於小六時已在學校接種MMR混合疫苗。

* 於1997/98學年或以後就讀小一的人士已於小一時在學校接種第二劑MMR混合疫苗。

** 2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童於小一時在學校接種MMRV混合疫苗。

‡ 由2020年1月2日起提前為18個月大兒童接種第二劑MMRV混合疫苗。

注意：

- 絕大部分（百分之九十五或以上）人士在接種一劑含德國麻疹疫苗後可獲長期，甚至終生保護。
- 如你對風疹免疫力有疑問或不確定曾否感染風疹，應就接種德國麻疹疫苗事宜諮詢醫生意見。
- 接種疫苗後身體約需兩星期產生風疹免疫力。



衛生防護中心



衛生防護中心網站
www.chp.gov.hk



衛生防護中心 Facebook 專頁
fb.com/CentreforHealthProtection

衛生署健康教育專線

2833 0111



衛生署

二零二四年三月修訂