

2026/27 年度「院舍防疫注射計劃」 衛生署所提供的疫苗

接種前應考慮之因素	滅活流感疫苗 (IIV)		重組流感疫苗 (RIV)
	Anflu (三價流感疫苗 - 科興)	Vaxigrip (三價流感疫苗 - 賽諾菲)	Flublok Trivalent (三價重組流感疫苗 - 賽諾菲)
年齡及單次劑量	6 個月及以上人士 - 單次劑量：0.5 毫升	6 個月及以上人士 - 單次劑量：0.5 毫升	9 歲及以上人士 - 單次劑量：0.5 毫升疫苗
時程	凡 6 個月至 9 歲以下從未接種過季節性流感疫苗（流感疫苗）的兒童，建議在本季度應接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔 28 天。過去曾接種過任何流感疫苗的 9 歲以下兒童，在本季度只須接種一劑流感疫苗。凡 9 歲或以上人士只須每年接種一劑流感疫苗		凡 9 歲或以上人士只須每年接種一劑流感疫苗
注射方法	肌肉注射	首選的注射方法為肌肉注射，亦可以作皮下注射	肌肉注射
禁忌症	對任何疫苗成分，包括輔料、甲醛、Triton X-100 及慶大霉素敏感的人士； 患有急性疾病、嚴重慢性疾病¹、慢性疾病的急性發作、出現發燒的人士，應延後接種，直至其康復或病情穩定	對其活性成分、任何輔料或任何或會作為殘留物存在的成分新霉素、甲醛和 octoxinol-9 有過敏反應的人士； 如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗	對其活性成分、任何輔料或任何殘留物例如 octylphenol ethoxylate 有過敏反應的人士； 如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗
孕婦及哺乳期	目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用此產品的臨床試驗數據 若此人群需使用此疫苗，建議與醫生共同進行效益風險評估後決定	Vaxigrip 可以在懷孕時任何期間接種 哺乳期間婦女可以接種 Vaxigrip	Flublok Trivalent 可在懷孕期間使用 尚未清楚 Flublok Trivalent 是否會經由母乳分泌。哺乳期婦女接種 Flublok Trivalent 之前，應由專業醫療人員進行風險評估
備註 以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢您的醫生。			

(RVP) Version 20260904

¹ 嚴重慢性疾病是指施用治療後仍無法醫治或控制有關的慢性疾病，或病情狀況已超出醫護人員認為安全或適當的臨床參數範圍。