



邁 TOWARDS
向 2025

香港非傳染病防控策略及行動計劃
Strategy and Action Plan to
Prevent and Control NCD in Hong Kong

中學生篇

揭穿飲酒禍害



#年少無酒
#YoungAndAlcoholFree



衛生署
Department of Health

2019年9月版

不再受騙

偶爾飲一兩口酒也不該！

「適量」飲酒能 保護心臟嗎？

適量飲酒對心臟是否有保護作用仍具爭議。過量飲用紅酒與其他酒一樣有害，可引致心臟病和癌症。為了保護心臟而飲用已證實有毒物質，值得嗎？

飲酒後面紅 代表甚麼？

飲酒後面紅是因為體內缺乏一種分解酒精的酵素(乙醛脫氫酶，acetaldehyde dehydrogenase)，這實際上是身體累積酒後有害代謝物的一項徵兆。另外，科學研究並未發現真正有效的解酒方法。

飲酒可以減壓嗎？

酒精會刺激下丘腦激素釋放，令人更易感到壓力。壓力越大，飲得越多，造成惡性循環，可能引致酗酒。

酒的禍害

世界衛生組織指出：

導致2016年全球約

3,000,000

人死亡！



引致 **200** 多種疾病和損傷，
包括酒精依賴、精神病、肝硬化、
肝炎、中風、心臟病、癌症…



健康肝



硬化肝

- 與煙草一樣，是**第一類致癌物**，可引致口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌。
- 任何致癌物都沒有安全攝取量，**少量飲酒都有患癌風險**，飲得越多，風險越大。

還造成其他嚴重問題，包括醉酒鬧事、家庭暴力、性侵犯、車禍…

在香港，

- 2017年，共2,525人因酒精問題而入院
- 同年，因司機飲醉而導致的交通意外共74宗

感土忌溝綠茶醉青 的士猝死

一名24歲青年，凌晨與友人於旺角酒吧歡聚時，疑飲下大量「黑牌感土忌溝綠茶」，他帶醉獨自乘的士返家途中昏睡，青年送院後不治。該青年有吸煙飲酒習慣及平日少運動，有醫生懷疑他因冠心病發或急性酒精中毒致死。

(明報 11/01/2013)



醉酒廿跳橋命危

一名滿身酒氣的廿子，昨清晨在街頭與男友爭執後，疑情緒失控大發脾氣，赤腳狂奔衝上行人天橋，一躍而下飛墮十米下的馬路，情況危殆。

(東方日報 09/02/2014)

19歲青年醉死

一名19歲青年加班後與友人到酒吧消遣，於凌晨扶醉回家休息。八小時後被胞兄發現昏迷床上，全身冰冷，面部和身體發黑，有失禁痕迹。救護員到場後證實死亡。(太陽報 23/10/2012)

兩醉青偷小巴狂飆被捕

兩名18歲學生昨凌晨疑酒醉鬧事，偷走一輛小巴「揸大膽車」，先連撞六部停泊之的士，狂飆五公里後掃斷五條鐵柱及一個水龍頭，再撞向大樹才停下。二人最後被捕。

(星島日報 31/12/2011)

4少年



少廿泳池溺斃案 P場無限供酒

21歲少廿3年前參加夜間池畔派對，散場後被發現沉在池底，留醫一天後不治。死因庭上披露，當晚的酒精飲品是免費任飲形式無限量供應。醫生供稱，死者血液的酒精濃度高。

(蘋果日報 12/12/2017)



涉輪姦醉酒廿街坊

大埔一名廿子疑接受在寓所樓下回收場工作的4名少年邀約喝酒，最終不勝酒力醉倒，少年涉送廿子回家後乘虛而入，將其輪姦，4人同被控一項強姦罪。(明報 23/06/2013)

酒精對身體的影響因人而異，與年齡、性別、新陳代謝率、體形和身體結構、腸胃裡的食物份量、飲酒的速度和份量，以及服用藥物的情況等有關。總括而言，任何人都不宜飲酒。



飲酒有損青少年腦部發展

研究顯示：

- ・長期使用酒精的青少年記性較差
- ・酒精是青少年大腦發展過程中的神經毒素，影響神經發育及行為控制
- ・12 歲以下開始飲酒的青少年日後較有可能因飲酒而作暴力行為或受傷，或缺課
- ・18 歲以下開始飲酒的青少年於成年後較有可能濫用或依賴酒精，而愈早 (15歲以下) 開始飲酒，風險愈高

成績表

10
8
0
6

過量飲酒可致暴斃

暴飲

- ・一次過飲用至少5 罐/杯酒
- ・可導致車禍、暴力行為、不安全性行為、酒精中毒…
- ・研究顯示暴飲的青少年有較差的學習表現及較多的健康風險行為

酒精中毒

- ・當血液內酒精濃度太高，神經系統中負責維持呼吸、心跳、體溫等的部分便會停止運作，可導致突然死亡
- ・徵狀：精神錯亂、嘔吐、抽搐、呼吸困難、面色變青或蒼白、昏迷

飲酒可以致肥

- ・每克純酒精約含熱量7千卡，是空泛熱量，不提供任何營養
- ・1 罐啤酒(330毫升) = 142千卡 = 大半碗飯 = 約7粒方糖
- ・另外，酗酒會阻礙營養吸收，導致缺乏維他命B1、B2、B6、B9、C…

向酒精說**不**

1. 避免受朋友誘惑而嘗試吸煙或飲酒
2. 避免參加提供酒精飲品的活動
3. 慶祝、聚會時，選擇無酒精飲品，
如清水、無糖飲品

不同情況下選擇**不**同攻略 拒絕飲酒**7**式攻略

第1式：

- 無聲勝有聲，不用出聲說「**不**」
• 假裝沒收到邀請，以不回應
為回應

第2式：

- 簡單直接地說「**不**」
• 「我不飲，謝謝。」

第3式：找個理由說「**不**」

- 「我對酒精過敏，不飲了。」
- 「飲酒危害健康，不飲了。」
- 「明天還有要事去辦，不飲了。」
- 「今日身體不舒服，不飲了。」
- 「我不喜歡酒的味道，不飲了！」
- 「酒可以致肥，不飲了！」



第4式：找個好伙伴一同說「不」
•「我們都是不飲酒的。」



第5式：來個反建議說「不」
•「飲酒又貴又不健康，我們不如飲其他飲品吧。」

第6式：重覆地說「不」
•「我都說過不飲了！」

第7式：走為上策，迴避不利的環境
•說句「對不起，忽然記起有急事要辦」或
「對不起，家人來電」，然後「閃身」離開



酒精並不能幫助解決任何問題，相反，它將帶給你許多不良的影響。當你煩惱時，嘗試向父母、朋友或其他信賴的人傾訴，共同尋求解決問題的方法。

家庭約章

家長部分

- 我/我們承諾不會在子女面前飲酒。
- 我/我們承諾不會讓子女飲酒類飲品。
- 我/我們承諾不會帶子女去試酒或參加酒展。
- 我/我們承諾不會讓子女替自己買酒、開酒瓶或斟酒。
- 我/我們承諾不會把酒放在家中當眼處。
- 我/我們承諾會多與子女討論酒害問題。
- 我/我們會 _____。
- 我/我們會 _____。

家長簽署：_____

日期：_____

學生部分

- 我承諾不飲酒；如有人叫我飲酒類飲品，我會堅決拒絕。
- 我承諾會盡量避免出席有酒類飲品供應的場合或活動。
- 我承諾不會替別人買酒、開酒瓶或斟酒。
- 我承諾會與父母多討論酒害問題。
- 我承諾會勸喻身邊的人少飲酒或戒酒。
- 我承諾會 _____。
- 我承諾會 _____。

學生簽署：_____

輔導服務

1. 東華三院「遠酒高飛」預防及治療酗酒服務

電話：2884 9876

網址：<http://atp.tungwahcsd.org/>

2. 東華三院「心瑜軒」預防及治療多重成癮綜合服務中心

電話：2827 1000

網址：<http://icapt.tungwahcsd.org/>

相關資料

你可透過以下途徑索取更多相關的健康資訊：

衛生署「活出健康新方向」網站 www.change4health.gov.hk



中學生家長篇

揭穿飲酒禍害



家長自我反思

你知道酒精的禍害嗎？

你知道他們飲過酒嗎？

你有否在子女面前飲酒？

你知道酒精對青年有甚麼影響嗎？

他們會「有樣學樣」嗎？

你容許子女飲酒嗎？

他們為什麼飲酒？



給家長的建議

1. 建立良好親子關係，讓他們遇上問題時可與父母傾訴，不要借酒消愁。亦要多與子廿溝通飲酒相關話題，以了解他們對飲酒的態度及減少他們對酒的好奇心，如：
 - 醉酒的感覺及失態行為
 - 飲酒對身體、家庭及社會的害處
 - 讓小朋友自小了解不需要因切合社交場合需要而飲酒
2. 與子廿一起訂立有關不飲酒的家規，讓他們知道這些家規是要保護他們健康
3. 多留意子廿有否結交吸煙、飲酒或操行不良的朋友
4. 多留意子廿有否以下飲酒的徵兆：
 - 學業或操行問題
 - 轉換朋友圈
 - 從子廿的呼吸中聞到酒味
 - 無故紅面
 - 動作協調問題
 - 口齒不清
 - 記憶或集中力問題



5. 不要營造鼓勵子廿飲酒的家庭環境

- 做個好榜樣，不要在子廿面前飲酒
- 不要讓子廿飲酒類飲品
- 不要讓子廿進食含酒精的食物，如酒心巧克力、酒心雪糕等
- 不要讓子廿替自己買酒、開酒瓶或斟酒
- 不要供給子廿酒類飲品或把酒放在家中當眼處
- 不要帶子廿到宣傳推銷飲酒的活動或地方(如試酒會、調酒班、酒莊)，亦要特別注意和避開將酒與美食連在一起的展覽或宣傳



如何計算酒精攝取量

要知道你攝取了多少純酒精，可用以下公式計算自己飲了多少個「酒精單位」。一個「酒精單位」相等於10克純酒精。

酒精單位 = 飲品容量(毫升) × 酒精含量 (容量百分比) / 1000 × 0.789

飲品類型	一般酒精含量* (容量百分比)	酒精單位*	容量
 啤酒	5%	1	330毫升 (1罐)
 蘋果酒	5%	1	275毫升 (1細瓶裝)
 紅酒／白酒／香檳	12%	1	125毫升 (細酒杯)
 梅酒	15%	1	75毫升 (1/4細瓶裝)
 烈酒（如威士忌、伏特加、白蘭地）	40%	1	30毫升 (酒吧杯)
 中式烈酒或中式白酒	52%	1	25毫升 (0.5両)

備註：*上列數值僅為約數。

「理性飲酒」是誤導！

酒商說：

「理性飲酒指合理及知情地飲用酒精類飲品。這表示消費者不應該在懷孕期間或未成年時飲酒，同時不應酒後駕駛。消費者亦不應該過量飲用酒精類飲品，或因飲用酒精飲品而作出可能傷及個人或社會的行為。」

實際上…



這是他們的宣傳手法。他們閉口不提飲酒對人造成的傷害，如酒精可致癌、可使人上癮，反將飲酒引致的種種危害歸咎於飲酒人士，推卸責任、誤導大眾。



#年少無酒

#YoungAndAlcoholFree