

5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि Comirnaty खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू

16 फेब्रुअरी 2022 देखि, 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूले 10 माइक्रोग्राम (mcg) Comirnaty खोप* प्राप्त गर्न सक्छन्। COVID-19 संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको साथ, गम्भीर रोग र मृत्युको दरलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न COVID-19 रोगबाट बालबालिकालाई बचाउन को लागि खोप महत्वपूर्ण छ।

Comirnaty खोपको साथ प्राथमिक खोप दुई डोज चाहिन्छ # । स्थानीय विज्ञहरूको सिफारिस अनुसार, दुई खुराकहरू बीचको अन्तराल कमिमा 8 हप्ताको फरक हुनुपर्छ # । बच्चाहरूलाई स्थानीय विशेषज्ञहरूले मध्य-जांघको एन्टेरोलेटरल पक्षमा Comirnaty इन्ट्रामस्क्युलर रूपमा प्राप्त गर्न सिफारिस गरेका छन्, यद्यपि माथिल्लो हातमा इन्जेक्सनको लागि उनीहरूको प्राथमिकतालाई सम्मान गरिनेछ।

मायोकार्डाइटिस (हृदयको मांसपेशीको सूजन) र पेरीकार्डाइटिस (मुटुबाहिरको अस्तरको सूजन) को धेरै दुर्लभ केसहरू Comirnaty खोप लगाएपछि रिपोर्ट गरिएको छ। केसहरू मुख्यतया खोप लगाएको दुई हप्ता भित्र देखा परेका छन्, प्रायः दोस्रो खोप पछि, र प्रायः युवा पुरुषहरूमा देखा पर्दछ। तपाईं मायोकार्डाइटिस र पेरीकार्डाइटिसका लक्षणहरू, जस्तै सास फेर्न, धड्कन र छाती दुखाइको लागि सचेत हुनुपर्छ, र यी देखा पर्दा तुरुन्तै चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्। Comirnaty खोप लगाएको एक हप्तासम्म बालबालिकाले कडा व्यायाम नगर्नु पर्छ।

10 mcg Comirnaty भ्याक्सिनको डोज पाएका र दोस्रो वा तेस्रो डोज (तर अझै 13 वर्षको उमेरमा नपुगेका) 12 वर्षको भइसकेका 5-11 वर्षका बालबालिकाहरूले आफ्नो लागि सोही खुराक प्राप्त गरि रहनुपर्छ। दोस्रो वा तेस्रो खुराक (अर्थात् 10 mcg को एक खुराक)। यद्यपि, तिनीहरूले आफ्नो दोस्रो वा तेस्रो खुराकको लागि वयस्क खुराक (अर्थात् 30 mcg को खुराक) प्राप्त गर्न पनि छनौट गर्न सक्छन्।

* खोप आपूर्तिको अधीनमा, खोप स्थलहरूले एक खुराक प्रदान गर्नेछन् 10 mcg Comirnaty भ्याक्सिनको पेडियाट्रिक फॉर्म्युलेसन वा Comirnaty भ्याक्सिनको वयस्क खुराकको एक तिहाई।

• अभिभावक/अभिभावकले व्यक्तिगत आवश्यकता भएका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई व्यक्तिगत जोखिम र लाभलाई ध्यानमा राखी सूचित सहमति अन्तर्गत दोस्रो डोजलाई उनीहरूको पहिलो डोजबाट 21 दिनपछि अघि बढाउने व्यवस्था गर्न सक्छन्।

• इम्युनोकमप्रोमाइड बच्चाहरूका लागि, पहिलो दुई खुराकहरू बीचको अन्तराल कमिमा 21 दिन हो, तेस्रो डोज दोस्रो डोजको 28 दिन पछि, र चौथो डोज दिनु पर्छ तेस्रो खुराक पछि 90 दिन।

• पहिलेको COVID-19 संक्रमण भएका बच्चाहरूको लागि, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्

"अधिल्लो COVID-19 सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूका लागि COVID-19 खोपसम्बन्धी तथ्यपत्र"।

बाल चिकित्सा सूत्र Comirnaty खोप को सम्भावित साइड इफेक्ट

सबै खोपहरू जस्तै, Comirnaty ले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, यद्यपि सबैले तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दैनन्।

धेरै सामान्य साइड इफेक्ट:

10 मा 1 भन्दा बढी व्यक्तिलाई असर गर्न सक्छ

- इंजेक्शन साइट: दुखाइ, सूजन, रातोपन
- थकान
- टाउको दुखाइ
- मांसपेशी दुखाइ
- चिसो
- संयुक्त दुखाइ
- पखाला
- ज्वरो

यी मध्ये केही साइड इफेक्टहरू वयस्कहरूको तुलनामा 12 देखि 15 वर्षका किशोरहरूमा अलि बढी बारम्बार थिए।

सामान्य साइड इफेक्टस:

10 मा 1 जनालाई असर गर्न सक्छ

- वाकवाकी
- वान्ता

असामान्य साइड इफेक्ट:

100 जनामा 1 जनालाई असर गर्न सक्छ

- विस्तारित लिम्फ नोडस (बुस्टर खुराक पछि धेरै पटक अवलोकन गरिएको)
- अस्वस्थ महसुस गर्दै
- हात दुखाइ
- अनिद्रा
- इंजेक्शन साइट खुजली
- एलर्जी प्रतिक्रियाहरू जस्तै दाग वा खुजली
- कमजोर वा ऊर्जाको कमी / निद्रा महसुस
- कम भोक
- अत्यधिक पसिना आउने
- रात्री पसिना

दुर्लभ साइड इफेक्ट:

1,000 मा 1 जनालाई असर गर्न सक्छ

- अस्थायी एक पक्षीय अनुहार झुक्नु
- एलर्जी प्रतिक्रियाहरू जस्तै पित्ता वा अनुहार सुत्रिने

धेरै दुर्लभ साइड इफेक्ट:

10,000 मा 1 जनालाई असर गर्न सक्छ

- मुटुको मांसपेशीको सूजन (मायोकार्डाइटिस) वा मुटुको बाहिरको अस्तरको सूजन (पेरीकार्डाइटिस) जसले सास फेर्न, धड्कन वा छाती दुख्न सक्छ।

थाहा छैन

(उपलब्ध तथ्यांकबाट अनुमान गर्न सकिदैन)

- गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया
- खोप लगाइएको अंगको व्यापक सूजन
- अनुहार सुत्रिने (अनुहार सुत्रिने रोगहरूमा हुन सक्छ जसको अनुहारको छालाको फिलर भएको छ)
- छालाको प्रतिक्रिया जसले छालामा रातो धब्बा वा दागहरू निम्त्याउँछ, जुन टार्गेट वा "बुल्स-आँखा" जस्तो देखिन सक्छ र गाढा रातो केन्द्रको वरिपरि प्यालर रातो छल्लेहरू छन्। (एरिथेमा मल्टीफोर्म)
- छालामा असामान्य भावना, जस्तै झनझन वा घस्रने भावना (पेरेस्टेसिया)
- कम भावना वा संवेदनशीलता, विशेष गरी छालामा (हाइपोएस्थेसिया))

को सामग्री

बाल चिकित्सा सूत्र Comirnaty खोप

यदि तपाईंलाई Comirnaty को अधिल्लो खुराक, वा सक्रिय पदार्थ वा यस औषधिको अन्य कुनै पनि अवयवहरू सहित एलर्जी छ भने, कृपया खोप प्राप्त नगर्नुहोस्:

((4 -हाइड्रोक्सीब्युटाइल)अजेनेडाइल)बिस(हेक्सेन- 6,1 -डाइएल)बिस(2 -हेक्साइलडेकानोएट)
(ALC-0315) / २ -[[पोलिथिलीन ग्लाइकोल) -2000]-एन,एन-डाइटेट्राडेसाइलेसेटामाइड (ALC-
0159)) /

1,2 -ग्लिसरॉल्लोयल-एसएन-ग्लिसरोल- 3- - फोस्फोकोलिन (DSPC) /

कोलेस्ट्रॉल / ट्रोमेटामोल / ट्रोमेटामोल हाइड्रोक्लोराइड / सुक्रोज / इंजेक्शन को लागी पानी

संस्करण मिति: 2 नोभेम्बर 2022

अनुवादित संस्करण सन्दर्भको लागि मात्र हो। संस्करण मिति: 2 नोभेम्बर 2022।

अनुवादित संस्करण र अङ्ग्रेजी संस्करण बीचको भिन्नता भएमा, अंग्रेजी संस्करण प्रबल हुनेछ।

हङकङ क्रिस्चियन सर्भिसद्वारा सञ्चालित Kwun Tong मा रहेको केन्द्रले जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरूको प्रयोगमा मद्दत गर्न केन्द्रीकृत टेलिफोन व्याख्या सेवा प्रदान गर्दछ। कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्:

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm

Translated version is for reference only. Version date: 2 November 2022.

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised telephone interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer to:

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm