

使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童



使用抗生素可治療細菌感染，但同時亦會殺死身體內之正常細菌，及增加感染抗藥性細菌的風險。

保障您與家人的健康，請注意個人衛生：

1. 時刻保持手部衛生
2. 食水和食物必須徹底煮沸及煮熟
3. 消毒及覆蓋傷口
4. 當有呼吸道感染徵狀時，請戴上口罩
5. 有傳染病徵狀的幼童，應盡可能減少接觸其他兒童

