

## सुझाव कीट प्रतिरोधी का उपयोग करने के लिए

1. लेबल निर्देशों और सावधानियों के अनुसार शरीर और कपड़ों के उजागर भागों में कीट प्रतिरोधी युक्त डीईईटी लागू करें।
2. 6 महीने की आयु के तहत शिशुओं में कीट प्रतिरोधी युक्त डीईईटी का उपयोग करने से बचें  
\*। वेक्टर काटने और डंक को रोकने के लिए वैकल्पिक उपायों का प्रयोग करें।
3. जब डीईईटी कीट प्रतिरोधी युक्त बच्चों में उपयोग किया जाना चाहिए:
  - डीईईटी की कम ता का उपयोग करें - 10% तक \*
  - बच्चों को कीट प्रतिरोधी को छूने या सवयं करीम लगाने की अनुमति न दें। वयसकों को अनपे हाथों में कीट प्रतिरोधी को लगाना चाहिए और फिर इसे बच्चों पर लगाना चाहिए
  - युवा बच्चों के हाथों, आंखों और मुंह के आसपास, या टूटी हुई या खारिश वचा पर न लगाए
  - कीट प्रतिरोधी को उनकी आंखों में न जाने दें
  - रोल-ऑन सामग्री स्परे के लिए बेहतर हैं
  - कृमया खुले क्षेत्रों में प्रतिरोधी स्परे करें और बच्चों को सांस लेने की अनुमति न दें
  - कृमया बच्चों से दूरी पर प्रतिरोधी करीम रखें और बच्चों को नगिनले की अनुमति न दें
  - कृमया इसे वचा पर न लगाए और इसे कपड़ों पर लगाए
  - बच्चों के इलाज की वचा को पानी से धोएं या घर लौनटे के बार्द उ हैं सनाकरें
  - कीट प्रतिरोधी के संपर्क में आने वाले कपड़े धोने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करें, और

- अपने शिशुओं को स्तनपान कराने से पहले नर्सिंग माताओं को अपने हाथों और शरीर से

प्रतिरोधी क्रीम धोने के लिए सलाह दें

\* उन बच्चों या बच्चों के लिए यात्रा करने वाले बच्चों के लिए जहां मच्छर से पीड़ित बीमारियां स्थानिक या महामारी हैं और जहां एक्सपोजर की संभावना है, 2 महीने या उससे अधिक आयु के बच्चे

डीईईटी युक्त कीट प्रतिरोधी का उपयोग डीईईटी की एकाग्रता के साथ 30% तक कर सकते हैं।

4. कीट प्रतिरोधी युक्त डीईईटी का उपयोग कर गर्भवती महिलाओं की सिफारिश के लिए, कृपया परिवार स्वास्थ्य सेवा वेबसाइट पर जाएं।

5. यदि लेबल निर्देशों का पालन किया जाता है और उत्पाद सुरक्षित रूप से उपयोग किया जाता है

तो डीईईटी युक्त कीट प्रतिरोधी का उपयोग हानिकारक नहीं होना चाहिए। दुर्लभ मामलों में,

डीईईटी उत्पादों का उपयोग त्वचा की चकते का कारण बन सकता है। कुछ लोग जिन्होंने

डीईईटी की उच्च सांद्रता वाले उत्पादों का उपयोग किया था या जिन्हें डीईईटी की अत्यधिक

मात्रा में उजागर किया गया था, उनमें त्वचा के चकते, छाले और त्वचा और श्लेष्म झिल्ली

जलन का अनुभव हुआ है।

6. डीईईटी के अलावा, अन्य सक्रिय अवयवों के साथ कीट प्रतिरोधी, उदाहरण के लिए आईआर

3535, आईकरिडिन (जिसे पिकारिडिन भी कहा जाता है) आदि बाजार में भी उपलब्ध हैं।

किसी भी कीट प्रतिरोधी का उपयोग करते समय, जनता के सदस्यों को लेबल निर्देशों और

सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

23 मार्च 2018

23 August 2018