

季節性流感疫苗的參考資料

(1) 季節性流感疫苗

根據世界衛生組織（世衛）的監測數據，B 型流感病毒抗原 B/Yamagata 譜系病毒目前已在人群中停止傳播，因此在 2026-27 季度只建議使用三價疫苗。三價疫苗能有效預防流感及其併發症，並降低流感相關的住院和死亡風險，具有極佳的安全性。

院舍防疫注射計劃2026/27季度使用的以雞胚生產的三價疫苗包括以下成分：

- 類甲型/密蘇里/11/2025（H1N1）pdm09 病毒
- 類甲型/達爾文/1454/2025（H3N2）病毒
- 類乙型/東京/EIS13-175/2025（B/Victoria 譜系）病毒

為確保對季節性流感產生足夠的免疫力，凡 6 個月至 9 歲以下從未接種過季節性流感疫苗（流感疫苗）的兒童，建議在 2026/27 季度應接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間應至少相隔 28 天。過去曾接種過任何流感疫苗的 9 歲以下兒童，在 2026/27 季度只須接種一劑流感疫苗。凡 9 歲或以上人士只須每年接種一劑流感疫苗。

注射劑量方法和部位

私家醫生會為接種人士於上臂三角肌中央部位的肌肉內／大腿前外側（嬰幼兒）進行肌肉注射。至於出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教私家醫生。如有需要，私家醫生可為個別人士作皮下注射接種（視乎個別疫苗品牌）。

誰不宜接種滅活流感疫苗？

對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士，都不宜接種滅活流感疫苗。對雞蛋有輕度過敏的人士如欲接種流感疫苗，可於基層醫療場所接種以雞胚生產的滅活流感疫苗，並於接種後接受 30 分鐘的觀察。而曾對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。流感疫苗內雖含有卵清蛋白（即雞蛋白質），但疫苗製造過程經過反覆純化，卵清蛋白的含量極低，即使對雞蛋敏感的人士，在一般情況下亦能安全接種。出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教私家醫生。如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。詳情請向私家醫生查詢。

(2) 疫苗貯存方法

- (i) 須保存在攝氏+2 至+8 度的雪櫃內（附有最高／最低溫度計），避免燈光直接照射。
- (ii) 切勿貯存於冰格內，如疫苗曾結冰，請勿使用，並立即通知本署。
- (iii) 為確保雪櫃內的溫度合乎標準，應在雪櫃內設置溫度計，並每天早、晚檢查並記錄在「貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表」上，及作出適當的調校。