

# 2021／22「疫苗資助計劃」 接種季節性流感疫苗的資料



疫苗接種計劃

## 1. 誰符合資格於計劃下接種流感疫苗？

以下香港居民可獲得政府資助接種流感疫苗：

- 孕婦；
- 50 歲或以上人士（以出生年份計算）；
- 6 個月至未滿 12 歲，或 12 歲或以上但仍就讀於香港小學的兒童；
- 智障人士：持有殘疾人士登記證（註明智障或弱智），或註冊醫生／指定的服務智障人士機構負責人簽發的證明書證明該人士可獲資助接種疫苗；
- 領取傷殘津貼的人士：持有社會福利署發出的傷殘津貼批准信；
- 12 歲至未滿 50 歲並領取綜合社會保障援助（綜援）計劃下標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」人士，請提供於 2018 年 12 月 15 日前簽發而仍有效的「綜合社會保障援助受助人醫療費用豁免證明書」，或有效的「申請獲准通知書」／「調整援助金額通知書」內的附頁，並在接種疫苗前，於參與計劃診所提供的聲明書上簽署。

部分人士可能符合資格到「政府防疫注射計劃」的公營診所免費接種疫苗。詳情請瀏覽中心網站（[www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk)）。

## 2. 哪些醫生已登記參與計劃，並提供資助的流感疫苗接種服務？

已登記參與計劃的私家醫生，會在其診所張貼計劃標記。有關已登記參與計劃的醫生資料和他們的收費，亦會上載於中心網站（<https://apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search>）。



參與疫苗資助計劃

醫生名單

## 3. 誰人可簽署「使用疫苗資助同意書」（同意書）？

十八歲以下或精神上無認知能力的人士，應由家長／監護人填妥並簽署同意書。其他疫苗接種人士可自行填妥並簽署同意書。

## 4. 若家長／監護人未能親身陪同合資格子女／受監護人前往診所，他／她可否委託他人例如：親友／家庭傭工陪同合資格人士前往？

可以，家長／監護人須預先填妥並簽署同意書，子女／受監護人才可於診所獲得資助接種流感疫苗。家長／監護人可向參與計劃的私家醫生診所索取該同意書，或在中心網站下載。

## （II）接種流感疫苗的資料

同時患上流感與2019冠狀病毒病會有較大機會出現嚴重疾病及死亡，接種流感疫苗可減少入院留醫的機會和住院時間。滅活流感疫苗、重組流感疫苗和滅活噴鼻式流感疫苗均獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用。三種疫苗的適用人士有一些不同。大部分的滅活流感疫苗適用於 6 個月或以上的人士，包括健康人士、懷孕婦女和有長期健康問題的人士。重組流感疫苗適用於 18 歲或以上的人士。滅活噴鼻式流感疫苗適用於 2 至 49 歲的人士，除懷孕、免疫力低或有其他禁忌症的人士外。詳情請向你的家庭醫生查詢。在接種流感疫苗後，由於身體需約兩星期才能產生抗體預防流感病毒，因此應儘早接種流感疫苗。



季節性流感疫苗接種  
常見問題

如欲參閱有關季節性流感疫苗接種的常見問題，請瀏覽衛生防護中心網站  
<https://www.chp.gov.hk/tc/features/100764.html>。

# 2021／22「疫苗資助計劃」 65 歲或以上長者接種肺炎球菌疫苗的資料



## (I) 「疫苗資助計劃」

合資格長者可全年獲資助接種肺炎球菌疫苗。每劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗）資助額為港幣 300 元；每劑十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗）資助額為港幣 760 元。



疫苗接種計劃

## (II) 長者接種肺炎球菌疫苗的資料

長者有較高機會出現嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病，例如敗血病、入血性肺炎、腦膜炎等。接種肺炎球菌疫苗能有效預防肺炎球菌感染和其併發症。為加強預防肺炎球菌感染，政府會為 65 歲或以上的香港居民提供資助接種肺炎球菌疫苗，詳情如下：

65 歲或以上長者	從未接種肺炎球菌疫苗	曾接種二十三價疫苗	曾接種十三價疫苗	曾接種十三價及二十三價疫苗
沒有高風險情況	資助接種一劑二十三價疫苗	不須要再接種	不須要再接種	不須要再接種
有高風險情況	資助接種一劑十三價疫苗，一年後資助接種一劑二十三價疫苗	在上一次二十三價疫苗接種的一年後，資助接種一劑十三價疫苗	在上一次十三價疫苗接種的一年後，資助接種一劑二十三價疫苗	不須要再接種

高風險情況包括：

- 曾患侵入性肺炎球菌病、腦脊液滲漏或裝有人工耳蝸；
- 長期心血管疾病（高血壓而沒有併發症除外）、肺病、肝病或腎病；
- 新陳代謝疾病包括糖尿病或肥胖（體重指數 30 或以上）；
- 免疫力弱（因情況如無脾臟、人類免疫力缺乏病毒感染／愛滋病或癌症／類固醇治療引致）；及
- 長期神經系統疾病致危及呼吸功能、難於處理呼吸道分泌物、增加異物入肺風險或欠缺自我照顧能力。

### 1. 肺炎球菌疫苗是否安全？可能有甚麼副作用？

肺炎球菌疫苗已獲證實安全。常見不良反應包括接種疫苗部位可能在接種後短時間內出現輕微腫脹及疼痛，但大部分反應在兩天內會自然消退。有些人可能會出現輕微發熱、疲勞、頭痛、發冷或肌肉疼痛。

### 2. 誰不適合接種肺炎球菌疫苗？

如曾在接種肺炎球菌疫苗後或對該疫苗的成分或含有白喉類毒素的疫苗出現嚴重過敏反應，則不應繼續接種肺炎球菌疫苗。

### 3. 肺炎球菌疫苗可否在某些醫療程序前或後接種？

在許可的情況下，將要進行脾臟切除手術的人士應在手術前最少兩周完成肺炎球菌疫苗接種。在理想情況下，肺炎球菌疫苗應該在化療／放射治療之前或完成之後接種，但是在長期使用化療藥物的過程中，仍然可以按照臨床需要接種。

如欲參閱有關肺炎球菌疫苗接種的常見問題，請瀏覽衛生防護中心網站  
<https://www.chp.gov.hk/tc/features/100770.html>。



肺炎球菌疫苗接種  
常見問題